

## مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت خود و زوج درمانی هیجان‌مدار بر خودجرحی در زنان قربانی خشونت خانگی

### Comparison of Effectiveness of Self-Compassion Therapy and Emotionally Focused Therapy on Self-Injury of Women with Domestic Violence

Seyedeh Saeideh Ghorbanzadeh

Ph.D. student Psychology, Department of Psychology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran.

Dr. Azar Kiamarsi\*

Assistant Professor, Department of Psychology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

A.Kiamarsi@iauardabil.ac.ir

Dr. Abas Abolghasemi

Professor, Department of General Psychology, Faculty of Human Science, Gilan University, Rasht, Iran.

سیده سعیده قربانزاده

دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

دکتر آذر کیامرثی (نویسنده مسئول)

استادیار، گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

دکتر عباس ابوالقاسمی

استاد، گروه روانشناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

#### Abstract

The present study was conducted to compare the effectiveness of self-compassion-focused therapy and emotionally-focused couple therapy on self-injury among women with domestic violence. This research was a semi-experimental type of research with a pre-test, post-test, and 2-month follow-up period with a control group. Based on this, 60 women with domestic violence referred to the welfare of Tehran city in 2022 were purposeful sampling selected and randomly assigned to groups (20 women in each group). To collect information, an inventory of statements about self-injury (ISAS) by Klonsky and Glenn (2009) was used and The research data was analyzed by mixed variance analysis (with repeated measurements). The results showed that in the post-test, there was a significant difference in self-injury between the two interventions ( $P<0.05$ ). On the other hand, a statistically significant difference was reported between two interventions with the control group ( $P<0.05$ ). In other words, both methods have an effect on reducing self-injury and these two interventions significantly differ in effectiveness on this variable in women; These results were also seen in the follow-up of both interventions ( $P<0.05$ ). It is concluded that both two interventions were able to reduce self-injury, But emotionally focused couple therapy was more effective in reducing self-injury; Therefore, emotionally focused couple therapy can be used in the treatment of women with domestic violence.

**Keywords:** Domestic Violence, Self-Injury, Self-Compassion-Focused Therapy, Emotionally Focused Couple Therapy.

#### چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت خود و زوج درمانی هیجان‌مدار بر خودجرحی در زنان قربانی خشونت خانگی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری دو ماهه بود. بر همین اساس ۶۰ نفر از زنان قربانی خشونت خانگی مراجعه کننده به بهزیستی شهر تهران در سال ۱۴۰۱ به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه‌ها گمارده شدند (هر گروه ۲۰ نفر). به منظور جمع‌آوری داده‌ها از سیاهه رفتارهای خودآسیب رسان (ISAS) کلونسکی و گلین (2009) استفاده شد و اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تحلیل گردید. نتایج نشان داد در پس‌آزمون خودجرحی بین دو مداخله تفاوت معناداری وجود دارد ( $P<0.05$ ). همچینین بین مداخلات با گروه کنترل تفاوت معنادار آماری گزارش شد ( $P<0.05$ ). به عبارتی هر دو روش بر کاهش خودجرحی اثر داشته‌اند و این دو مداخله تفاوت معناداری از نظر نیز دیده شد ( $P<0.05$ ). نتیجه‌گیری می‌شود هر دو مداخله توانستند خودجرحی را کاهش دهند؛ اما زوج درمانی هیجان‌مدار در کاهش خودجرحی موثرتر عمل کرد؛ از این‌رو این درمان می‌تواند در درمان زنان قربانی خشونت خانگی به کار گرفته شود.

**واژه‌های کلیدی:** خشونت خانگی، خودجرحی، درمان مبتنی بر شفقت خود، زوج درمانی هیجان‌مدار.

## مقدمه

خانواده می‌تواند شخصیت انسان‌ها را در درون خود شکل دهد و این کانون با پیوند زناشویی بین زن و مرد و ازدواج آنها با هم شکل می‌گیرد (کاتینو<sup>۱</sup> و همکاران، ۲۰۲۲). به طوری که می‌توان گفت، نیاز به صمیمیت و عشق زن و مرد را به سوی هم کشانده و پیوند زناشویی بین آنها شکل می‌گیرد (لو<sup>۲</sup> و همکاران، ۲۰۲۲). یکی از ویژگی‌های ازدواج، تعهد هر یک از همسران در قبال یکدیگر و حقوق متقابل بوده، به گونه‌ای که این تعهد شالوده زندگی مشترک است (آن<sup>۳</sup> و همکاران، ۲۰۲۲)؛ در غیر این صورت اعتماد متقابل بین همسران کمتر می‌شود که در بین این عواملی مانند پیمان شکنی، نارضایتی از زندگی زناشویی و خشونت زناشویی این اعتماد و تعهد را خدشه دار کرده و زندگی زناشویی به سمت جدایی می‌کشاند (دوی<sup>۴</sup> و همکاران، ۲۰۲۲). بنابراین یکی از عواملی که زندگی زناشویی را تهدید می‌کند، خشونت خانگی است که در برگیرنده هر نوع اقدام خشونت آمیز جسمی، روان شناختی و جنسی است که منجر به آسیب بدنشی، جنسی یا روانی زنان می‌شود و همچنین برای آنان رنج آور بوده یا به محرومیت اجباری از آزادی فردی با اجتماعی زنان منجر می‌گردد (ولی‌زاده و احمدی، ۱۴۰۰). آنچه می‌تواند میزان خشونت خانگی را کمتر کند و روابط زناشویی زوجین را به سوی روابط صلح‌آمیز با کنشوری سالم پیش‌برد، عملکرد سالم خانواده است که تاثیرات مثبتی بر سلامت و رفاه (بهزیستی) اعضای خانواده و زندگی زوجین دارد (بلکول<sup>۵</sup> و همکاران، ۲۰۲۳).

بر اساس پژوهش‌ها، زوجینی که بیشتر روابط خشونت آمیز در زندگی زناشویی خود را تجربه می‌کنند، خودجرحی بیشتری دارند، به طوری بر اساس نتایج یک پژوهش می‌توان گفت که تجربه خشونت فیزیکی و روانی شوهر علیه زنان باعث می‌شود که زنان افکار خودکشی و خودکشی بیشتری را نیز تجربه کنند (احمدی و همکاران، ۱۳۹۳). خودجرحی یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌های بالینی رفتاری است که طی آن شخص عمداً به خود آسیب می‌زند و اقداماتی از قبیل بریدن و سوزاندن قسمت‌هایی از بدن، کوبیدن محکم سر، خوردن مواد سمی، فرو بردن اشیاء، ایجاد اختلال در فرآیند بهبودی زخم‌ها را شامل می‌شود و این رفتار بدون قصد خودکشی است ولی هدفمند بوده و از نظر اجتماعی غیرقابل قبول است (والش و روزن<sup>۶</sup>، ۱۹۸۸؛ به نقل از قره‌داغی و همکاران، ۱۴۰۰). بر اساس نتایج یک پژوهش نشان داده شده است که خودجرحی در دوران شیوع ویروس کرونا به دلیل خشونت‌های خانگی در افراد افزایش یافته است که این نتایج نشان می‌دهد خشونت خانگی تاثیر بسزایی بر رفتارهای خودجرحی افراد در خانه دارد (اولدینگ<sup>۷</sup> و همکاران، ۲۰۲۱). در راستای این مشکلات که زنانی که خشونت خانگی که تجربه کرده‌اند و در حال تجربه خشونت خانگی هستند ارائه مداخلات روان شناختی برای کاهش مشکلات آنان از اهمیت فراوانی برخوردار است (گل محمد و همکاران، ۱۴۰۰). یکی از مداخلاتی که می‌تواند به زنان قربانی خشونت خانگی کمک کند تا خودجرحی کمتری را تجربه کنند، درمان مبتنی بر شفقت خود<sup>۸</sup> است که در طول ۲۰ سال گذشته، به عنوان یک مداخله نوظهور محبوبیت پیدا کرده است و با تکیه بر رویکردهای مختلف از علوم اعصاب، روانشناسی تکاملی، رشدی و اجتماعی و سنت‌های بودایی، بخشی از موج سوم درمان‌های شناختی و رفتاری در نظر گرفته می‌شود که بر ذهن آگاهی، پذیرش، فراشناخت، احساسات، ارزش‌ها و اهداف تأکید دارند (کارواله‌و<sup>۹</sup> و همکاران، ۲۰۱۷).

درمان مبتنی بر شفقت خود توسط گیلبرت<sup>۱۰</sup> (۲۰۰۰) توسعه یافت و هدف آن ایجاد شفقت در رنج انسان از طریق رویکرد فراتشخیصی آن است (کریگ<sup>۱۱</sup> و همکاران، ۲۰۲۰). شفقت به خود به حمایت از خود در هنگام تجربه رنج یا درد اشاره دارد - خواه ناشی از اشتباہات شخصی یا چالش‌های بیرونی زندگی باشد (نف<sup>۱۲</sup>، ۲۰۲۳). در پژوهش گرمر<sup>۱۳</sup> (۲۰۲۳) با توجه به درمان مبتنی بر شفقت خود و برنامه شفقت خود آگاهانه، راهنمایی‌هایی را در مورد چگونگی ادغام شفقت به خود در روان درمانی ارائه می‌دهد و شواهدی را ارائه می‌دهد که شفقت به خود را با فرآیندها و پیامدهای درمانی مرتبط می‌کند. به طوری که می‌توان بر این اساس گفت که شفقت به خود با فواید

1. Catino

2. Lu

3. Allen

4. Dew

5. Blackwell

6. Walsh & Rosen

7. Olding

8. Self-Compassion-Focused Therapy (SCFT)

9. Carvalho

10. Gilbert

11. Craig

12. Neff

13. Germer

بی‌شماری برای سلامت روان و بهزیستی روان شناختی افراد همراه است و تأثیر سودمندی شفقت به خود شاید حتی در روان درمانی مشهودتر باشد، جایی که شفقت به خود برای مدت طولانی زیر چتر «پذیرش خود» نقش دارد می‌تواند بر بھبود بسیاری از مشکلات افراد در زندگی موثر باشد (ویلسون<sup>۱</sup> و همکاران، ۲۰۱۹). تمرکز اصلی درمان مبتنی بر شفقت خود توسعه شفقت برای خود است (کیری<sup>۲</sup> و همکاران، ۲۰۱۷).

از سوی دیگر زوج درمانی هیجان‌مدار<sup>۳</sup> یکی از مداخلاتی است که می‌تواند زوجین را توانمند سازد و منجر به افزایش رضایتمندی زناشویی و کاهش مشکلات زنان قربانی خشونت خانگی شود، به طوری که می‌توان گفت که زوج درمانی هیجان‌مدار باعث می‌شود که زوجین پیوندهای عاطفی بین خود را محکم کنند و ارتباط بین خود را بهبود بخشنند (گریمن و جانسون<sup>۴</sup>، ۲۰۲۲). افزون بر این، زوج درمانی هیجان‌مدار زوجین را در برابر مشکلات زناشویی در کانون خانواده محافظت می‌کند و سبک دلبرستگی ایمن بین آنها را به وجود می‌آورد و باعث می‌شود که زوجین نسبت به نیازهای همدیگر پاسخگو‌تر باشند (جانسون، ۲۰۰۸). زوج درمانی هیجان‌مدار به علت ساختارمند بودن و داشتن برنامه درمان مرحله به مرحله، اثربخشی بیشتری نسبت به دیگر رویکردها دارد و احتمال عود در آن به شدت کمتر است (جانسون<sup>۵</sup>، ۲۰۱۲). بر اساس پیشینه پژوهش زوج درمانی هیجان‌مدار باعث کاهش مشکلات زناشویی در زوجین می‌شود (مارن<sup>۶</sup> و همکاران، ۲۰۲۲). در مجموع می‌توان گفت که خشونت خانگی در زندگی زناشویی به عنوان مسأله‌ای فراگیر که سایر ابعاد زندگی فردی و اجتماعی زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد مطرح است و در این زمینه، درباره افزایش عملکرد مطلوب خانواده زنان تحت خشونت خانگی، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که در این پژوهش بر اساس دو رویکرد درمان مبتنی بر شفقت و زوج درمانی هیجان‌مدار انجام گرفت. در پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص موضوع پژوهش حاضر، به صورت مجزا به بررسی اثربخشی دو روش درمان مبتنی بر شفقت و زوج درمانی مبتنی بر هیجان‌مدار (مارن و همکاران، ۲۰۲۲؛ گل محمد و همکاران، ۱۴۰۰) بر بهبود مشکلات زناشویی پرداخته شده است، اما در این پژوهش به صورت یک جا به بررسی و مقایسه اثربخشی دو روش درمانی بر خودجرحی زنان قربانی خشونت پرداخته شد. افزون بر این، از نظر روش‌شناختی نیز، مطالعاتی که به مقایسه اثربخشی درمان شفقت خود و درمان هیجان‌مدار در بهبود خودجرحی زنان قربانی خشونت خانگی پرداخته است کمتر وجود دارد و این باعث می‌شود که نتوان درمان موثر و مورد نیاز این زنان را شناسایی کرد. لذا در باب دلایل منطقی و علمی برای مقایسه این دو این درمان، می‌توان گفت که وقتی بتوان از بین رویکردها و مداخلات روان شناختی مختلف و اثربخش از نظر مطالعات تجربی، یک درمان اثربخش‌تر را نسبت به درمان‌های دیگر را شناسایی کرد می‌توان به روانشناسان و زوج درمانگرانی که در زمینه کاهش مشکلات زنان قربانی خشونت خانگی فعالیت می‌کنند کمک کرد که از نتایج اینگونه تحقیقات استفاده کنند که چه نوع درمانی اثربخش‌تر است. به همین دلیل این پژوهش از تلویحات کاربردی در این زمینه، برای روان شناسان و زوج درمانگران برخوردار است. لذا بر اساس آنچه گفته شد هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت خود و زوج درمانی هیجان‌مدار بر خودجرحی در زنان قربانی خشونت خانگی بوده است.

## روش

روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون-گروه کنترل با دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری کلیه زنان متاهل قربانی خشونت خانگی مراجعه کننده به بهزیستی در شهر تهران در سال ۱۴۰۱ بود. نمونه پژوهش ۶۰ زن قربانی خشونت خانگی که به صورت هدفمند از میان مراجعه کننده‌های بهزیستی شهر تهران انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه جایدهی شدند (هر گروه ۲۰ نفر). داشتن سلامت روانی بر اساس پرونده آنان در بهزیستی، دامنه سنی افراد نمونه بین ۲۵ تا ۴۰ سال، گذشت حداقل ۲ سال از زمان ازدواج فرد از ملاک‌های ورود به پژوهش بود. غبیت بیش از ۲ جلسه در جلسات درمانی، شرکت همزنان در دیگر دوره‌ها و مداخلات درمانی همزنان با پژوهش و نقص در تکمیل پرسشنامه‌ها از ملاک‌های خروج از پژوهش بودند. بعد از این مرحله گروه‌های آزمایش پس از اخذ موافقت اخلاقی تحت درمان شفقت خود (۱۰ جلسه و هر هفته یک جلسه ۹۰ دقیقه‌ای) درمان هیجان‌مدار (۱۰ جلسه و هر هفته یک جلسه ۹۰ دقیقه‌ای) قرار گرفتند و گروه گواه در لیست انتظار باقی ماند. این مداخلات توسط خود پژوهشگر در مرکز مددکاری بهزیستی انجام شد. بعد از اتمام جلسات درمانی از هر گروه در

1. Wilson

2. Kirby

3. Emotionally Focused Couple Therapy (EFCT)

4. Greenman & Johnson

5. Johnson

6. Marren

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت خود و زوج درمانی هیجان‌مدار بر خودجرحی در زنان قربانی خشونت خانگی  
Comparison of Effectiveness of Self-Compassion Therapy and Emotionally Focused Therapy on Self-Injury of Women ...

شرایط پکسان پس‌آزمون به عمل آمد. در این مرحله هر گروه در شرایط مشابه به سوالات پس‌آزمون پاسخ دادند و همچنین بعد از گذشت ۲ ماه مرحله پیگیری انجام شد. اختیاری بودن همکاری با پژوهش و حق خروج از مطالعه، پاسخ به سوالات و در اختیار قرار دادن نتایج در صورت تمایل به زنان، ارائه جلسات مداخله به صورت فشرده به زنان گروه گواه بعد از اجرای پس‌آزمون، اطمینان بخشی به زنان از بدون ضرر بودن مداخلات درمانی و اخذ کد اخلاقی به شماره IR.IAU.ARDABIL.REC.1400.046 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل از اصول اخلاقی رعایت شده در این پژوهش بود. در این پژوهش از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن فرونی با نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ استفاده شد.

#### ابزار سنجش

**سیاهه رفتارهای خودآسیب رسان<sup>۱</sup> (ISAS):** یعنی سیاهه به وسیله کلونسکی و گلین (۲۰۰۹) طراحی شده است و دارای ۳۹ سوال و دو خرده مقیاس کارکردهای درون‌فردي<sup>۲</sup> و کارکردهای بین فردی<sup>۳</sup> را اندازه‌گیری می‌کند. نمرات به صورت لیکرت سه گزینه‌های از کاملاً غیر مرتبط صفر، تا حدی مرتبط ۱ نمره و کاملاً مرتبط ۲ نمره درجه بندی شده است. دامنه نمرات بین ۰ تا ۷۸ است و نمره بالاتر در این سیاهه نشان دهنده رفتارهای خودآسیب رسان بیشتر است. سازندگان سیاهه ویژگی‌های روان‌سنجی شامل پایایی و روایی را بررسی و برای محاسبه پایایی از آلفای کرونباخ استفاده کرده‌اند که ضرایب برای کارکردهای درون‌فردي ۰/۸۷ و کارکردهای بین‌فردی ۰/۸۰ گزارش کرده‌اند و روایی ملاکی (همزمان) آن را با مقیاس هیجانات منفی<sup>۴</sup> (DASS) لویباند<sup>۵</sup> و لویباند<sup>۶</sup> بررسی و ضرایب همبستگی پیرسون کارکردهای درون‌فردي با افسردگی ۰/۴۱ و با اضطراب ۰/۳۸ و معنادار در سطح ۰/۲۵ و با اضطراب ۰/۳۲ و همچنین ضرایب همبستگی پیرسون کارکردهای بین‌فردی با افسردگی ۰/۴۰ و با اضطراب ۰/۳۸ و معنادار در سطح ۰/۰۰ به دست آمده است (کلونسکی و گلین، ۲۰۰۹). این مقیاس در ایران توسط لطفی و همکاران (۱۴۰۱) ترجمه و هنجاریابی شده است و پایایی آن با آلفای کرونباخ بررسی و ضریب ۰/۹۳ محاسبه و روایی ملاکی (همزمان) آن با سیاهه شخصیت مرزی<sup>۶</sup> (BPI) لیشنرنینگ<sup>۷</sup> و ضرایب همبستگی پیرسون با آن با مقیاس رفتارهای خودآسیب‌رسان در دامنه ۰/۱۴ تا ۰/۲۲ و معنادار در سطح ۰/۰۵ به دست آمده است (لطفی و همکاران، ۱۴۰۱). در این پژوهش برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب پیش‌آزمون ۰/۸۱، پس‌آزمون ۰/۹۱ و پیگیری ۰/۹۲ به دست آمده است.

**جلسات درمانی:** منظور از درمان مبتنی بر شفقت در این پژوهش تعداد ۱۰ جلسه درمان شفقت خود بر اساس مفاهیم گیلبرت (۲۰۱۰) بود که گروه آزمایش آموزش دیدند که هر هفته یک جلسه به صورت گروهی و هر جلسه ۹۰ دقیقه توسط پژوهشگر که به درمان شفقت خود تسلط داشتند به گروه آزمایش ارائه شد.

جدول ۱. جلسات درمان مبتنی بر شفقت خود بر اساس نظریه گیلبرت (۲۰۱۰)

جلسه	هدف جلسه	محتوای جلسات	تغییر رفتاری مورد انتظار	تکلیف (تمرین)
۱	معارفه، آشنایی با درمان و اهمیت آن در زندگی	در این جلسه از اعضای هر دو گروه آزمایش و کنترل در شرایط پکسان پیش‌آزمون به عمل آمد و آنها بی‌کارکرده شفقت به خود پایینی داشتند به عنوان افراد گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند	رهایی از موافع	مشاهده عملکرد خانواده با توجه به مبانی درمان مبتنی بر شفقت خود ارائه شده
۲	آشنایی با اصول کلی درمان	در این جلسه هدف برقراری ارتباط اولیه، گروه‌بندی، معرفی بر ساختار جلسات، آشنایی با اصول کلی درمان متتمرکز بر شفقت خود	رهایی از عملکرد ناسازگارانه خانواده بر اساس اصول درمان مبتنی بر شفقت خود	اجام آرمیدگی عضلانی
۳	شناخت مولفه‌های شفقت خود	در جلسه دوم هدف شناسایی و معرفی مولفه‌های شفقت، بررسی هر مولفه شفقت در اعضای گروه و شناسایی ویژگی‌های آن (اهمیت تربیت ذهن مهربان)	کسب حس دلسویزه و مهربانانه نسبت به خود	تصویرسازی شفقت نسبت به دیگران و دریافت شفقت از دیگران

1. inventory of statements about self-injury (ISAS)

2. intrapersonal functions

3. interpersonal functions

4. Depression Anxiety Stress Scale (DASS)

5. Lovibond

6. Borderline Personality Inventory (BPI)

7. Leichsenring

آگاهی در رویارویی با مشکلات	پذیرش افکاری که در سطح هوشیاری قرار دارد	در این جلسه هدف مروری بر تکالیف جلسه قبل، پرورش احساس گرمی و مهربانی نسبت به خود	آموزش و پرورش شققت به خود اعضاء
تصویرسازی مکانی امن	کسب احساس عمیق زندگی کردن و تصریح اهداف ارزشمند	ترغیب آزمودنی‌ها به خودشناسی و بررسی شخصیت خود به عنوان فرد «دارای شفقت» با «غیر شفقت»، شناسایی و کاربرد تمرين‌های «پرورش ذهن شفقت آمیز» و آموزش تصویرسازی مکانی امن	خودشناسی و شناسایی عوامل خودانتقادی
بازنگری افکار مثبت / منفی، بدون قضابت، در حالت آرمیدگی عضلانی	کسب احساسات مثبت بدون هیچ قضابتی	تمرين کسب آگاهی کامل از افکار و احساسات و پذیرش انها بدون قضابت	آموزش فن آگاهی از احساسات بدون قضابت انها
به کارگیری این روش‌های موردنظر این جلسه در زندگی روزمره	کسب توانایی شفقت نسبت به خود	تمرين عملی ایجاد تصویری مهربانانه از خود، آموزش سبک‌ها و روش‌های ابراز شفقت (شفقت کلامی، شفقت عملی، شفقت مقطعي و شفقت پیوسته) و به کارگیری این روش‌ها در زندگی روزمره	آموزش سبک‌ها و روش‌های ابراز شفقت
تمرين شفقت ورزی به خود و دیگران در منزل و احساس همدلی با دیگران	کسب توانایی ابراز شفقت به خود و دیگران	آموزش نوشتن نامه‌های شفقت آمیز برای خود و دیگران،	فنون ابراز شفقت
جستجوی اهداف مثبت و خاتمه دادن به جنگ درونی	کسب حس خوشابند در محیط واقعی زندگی	تمرين تمرکز کردن بر نقاط مثبت و قوت در زندگی، تبدیل شدن به خالق اهداف و مسیرهای ارزشمند خویش	آموزش مورد هدف قرار دادن تعصبات منفی زندگی
-	کسب ذهن شفقت ورزانه نسبت به خود	در این جلسه مروری بر ۹ جلسه قبلی صورت گرفت و از افراد گروه قدردانی به عمل آمد و از آنها در شرایط یکسان پس آزمون به عمل آمد.	جمع بندی و اجرای پس آزمون

منظور از درمان مبتنی بر شفقت در این پژوهش تعداد ۱۰ جلسه زوج درمانی هیجان‌مدار بر اساس مفاهیم جانسون (۲۰۱۲) بود که گروه آزمایش آموزش دیدند که هر هفته یک جلسه به صورت گروهی و هر جلسه ۹۰ دقیقه توسط پژوهشگر که به زوج درمانی هیجان‌مدار تسلط داشتند به گروه آزمایش ارائه شد.

جدول ۲. جلسات زوج درمانی هیجان‌مدار اقتباس از جانسون (۲۰۱۲)

جلسه	هدف جلسه	محتویات جلسات	تغییر رفتاری مورد انتظار	تکلیف (تمرين)
۱	ارزیابی و ایجاد پیوستگی و شناسایی چرخه تعاملات منفی و تعیین اهداف کلی	ارزیابی اولیه ماهیت مشکل، ارزیابی انتظارات و نگرانی‌های زنان، مفهوم‌سازی مشکل و ارائه منطق درمان و آشنایی با قوانین کلی درمان.	به دست آوردن شناخت در زمینه چرخه تعاملات منفی	مهارت‌های کلیدی و ارتباط، ارزیابی خود، ارائه و دریافت بازخورد، توجه به حالات هیجانی خوشایند.
۲	ادامه ارزیابی و شناسایی و چرخه تعاملات منفی و تعیین اهداف کلی	کشف تعاملات مشکل‌دار و تشخیص چرخه تعاملات منفی، ارزیابی مشکل و موانع دلیستگی، ایجاد توازن درمانی باز کردن تجربه‌های بر جسته مربوط به دلیستگی، پذیرش احساسات تصدیق نشده بنیادی، روش کردن پاسخ‌های هیجانی کلیدی، پذیرش چرخه تعامل توسط مراجعان	به دست آوردن شناخت در زمینه چرخه تعاملات منفی	شناسایی چرخد تعامل‌های خود در موقعیت‌های مختلف
۳	تقویت پیوستگی و تحلیل و تعییر هیجانات	باز کردن تجربه‌های بر جسته مربوط به دلیستگی، پذیرش احساسات تصدیق نشده بنیادی، روش کردن پاسخ‌های هیجانی کلیدی، پذیرش چرخه تعامل توسط مراجعان	تقویت پیوستگی	شناسایی ترس‌های خود، انجام تمرين در زمینه تکیه‌گاه ایمن و توسعه پیوند ایمن، ابراز هیجانات و احساسات خاص، تجربه دوباره تعاملات و همراه با بیان احساسات خالص.
۴	تشدید تجربه هیجانی و ارتقای روش‌های تعامل	ابراز هیجانات، پذیرش هیجانات، عمق بخشیدن به دیگری با تجربه هیجانی، ارتقای روش‌های تعامل	پذیرش هیجانات	در میان گذاشتن رفتارهای مقابله‌ای خود با همسر، تشویق مراجع به

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت خود و زوج درمانی هیجان‌دار بر خودجرحی در زنان قربانی خشونت خانگی  
Comparison of Effectiveness of Self-Compassion Therapy and Emotionally Focused Therapy on Self-Injury of Women ...

درگیری هیجانی و عاطفی در تعاملات خود در منزل	دانشجویی نیازهای دلبستگی در زندگی زناشویی	بازسازی تعاملات و تغییر رویدادها نماد گذاری آرزوها، کشف راحل‌های جدید برای مشکلات قدیمی	پذیرش احساسات و شناسایی نیازهای دلبستگی، تقویت تعامل اعضاً گروه
اختصاص دادن زمان برای در میان گذاشتن، رفتار، افکار و هیجانات با شریک زندگی	کسب توانایی در زمینه الگوهای تعاملی با همسر	درگیری صمیمانه مراجعت با همسرانشان، پذیرش وضعیت‌های جدید، ساختن داستانی شاد از رابطه	ایجاد الگوهای تعاملی جدید تملک هیجانات
کشف عواطف اصلی خود، کامل کردن جدول چگونگی تاثیر گذاری هیجانات و رفتارهای زوجین بر یکدیگر	تسهیل بیان نیازها و خواسته‌ها در روابط جنسی	تاكید بر اهمیت بیان خواسته‌ها و نیاز جنسی استفاده از تکیک ردیابی و انعکاس مواجهه اعضا با سبک‌های دلبستگی شان	ایجاد درگیری‌های هیجانی افزایش شناسایی نیازهای دلبستگی.
تشویق به تغییر الگوهای تعاملی با استفاده همسرانشان، تشویق به پاسخگویی مسئولانه‌تر به نیازهای همسرانشان، تشویق به بیان نیازها و خواسته‌های جنسی	عمق بخشنیدن به درگیری های جنسی زوجین	کمک به اعضا گروه جهت تمرکز بر خود، تعیین و تشویق نیازهای اعضا گروه	تمرکز بر روی خود نه دیگری، چارچوبنده مجدد روابط جنسی،
تشویق پاسخ‌های جدید سازگارانه جدید بین زوجین، حمایت از رفتارهای جدید و پاسخگویانه	ارتقاء روش‌های جدید تعامل زوجین	جهت دهی و طراحی تعاملات بین زوجین جایگزینی چرخه تعاملات، مشیت به جای چرخه منفی، کشف، راه حل‌های جدید برای مشکلات قیمه‌ی	بارسازی تعاملات جنسی و غیر جنسی همسر
-	بحث درباره نقاط قوت / ضعف درمان،	خلاصه و مرور مطالب جلسات توسط اعضا برقراری گفتگوهای تعاملی، صمیمه‌ی و سازنده الگوهای تعاملی سازنده	تحکیم وضعیت و پاسخ‌های جدید، حمایت از الگوهای تعاملی سازنده

### یافته‌ها

میانگین و انحراف معیار سن گروه درمان مبتنی بر شفقت خود ۳۲/۸۵ و ۴۰/۸۹؛ گروه زوج درمانی هیجان‌دار ۳۴/۳۰ و ۴۹/۱۱ و گروه ۳۴/۷۵ و ۵/۲۱۰ بود. میزان آماره  $F$  بدست آمده حاصل از مقایسه میانگین‌های ۳ گروه در متغیر سن برابر با  $F=0/۶۷۰$  می‌باشد که این میزان به لحاظ آماری معنادار نمی‌باشد ( $Sig=0/۵۱۶$ ) که نشان دهنده همتا بودن ۳ گروه از نظر متغیر سن می‌باشد. جدول ۳- میانگین و انحراف معیار عملکرد خانواده را نشان می‌دهد.

جدول ۳. میانگین و انحراف معیار خودجرحی

متغیرهای وابسته	مرحله	میانگین							
		انحراف معیار		گروه گواه	گروه هیجان	گروه شفقت	گروه گواه	گروه هیجان	گروه شفقت
پیش‌آزمون	پیش‌آزمون	۰/۷۱۶	۰/۸۵۸	۰/۸۷۵	۱۳/۷۵	۱۴/۰۰	۱۵/۱۵	۱۴/۰۰	۱۵/۱۵
پس‌آزمون	کارکردهای درون فردی	۰/۸۱۳	۰/۷۸۶	۰/۹۴۰	۱۳/۶۵	۱۰/۷۵	۱۱/۴۰	۱۰/۷۵	۱۱/۴۰
پیگیری	پیگیری	۰/۸۰۱	۰/۸۱۳	۱/۱۷۴	۱۳/۷۰	۱۰/۸۵	۱۱/۳۰	۱۰/۸۵	۱۱/۳۰
پیش‌آزمون	کارکردهای بین فردی	۰/۵۲۳	۰/۸۱۳	۰/۸۵۸	۲۰/۸۰	۲۱/۸۵	۲۲/۰۰	۲۱/۸۵	۲۲/۰۰
پس‌آزمون	پیگیری	۰/۶۵۷	۲/۰۹۳	۱/۲۴۰	۲۰/۷۰	۱۷/۸۰	۱۸/۸۰	۱۷/۸۰	۱۸/۸۰
پیگیری	پیگیری	۰/۶۳۹	۲/۰۱۶	۱/۲۶۸	۲۰/۷۵	۱۷/۸۰	۱۸/۸۵	۱۷/۸۰	۱۸/۸۵
پیش‌آزمون	نمره کل خودجرحی	۰/۸۲۶	۱/۴۶۱	۱/۰۸۹	۳۴/۵۵	۳۵/۸۵	۳۷/۱۵	۳۴/۵۵	۳۷/۱۵
پس‌آزمون	پیگیری	۱/۱۳۷	۲/۲۵۹	۱/۷۶۵	۳۴/۳۵	۲۸/۵۵	۳۰/۲۰	۳۴/۳۵	۳۰/۲۰
پیگیری	پیگیری	۱/۱۴۶	۲/۳۴۶	۱/۹۲۷	۳۴/۴۵	۲۸/۶۵	۳۰/۱۵	۳۴/۴۵	۳۰/۱۵

جدول ۳ میانگین و انحراف معیار خودجرحی و ابعاد آن را نشان می‌دهد. بعد از بررسی مفروضه‌های آماری تحلیل واریانس مکرر، از این آزمون برای تحلیل داده‌ها گردآوری شده استفاده شد. برای بررسی نرمال بودن از آزمون شاپیرو-ویلکز استفاده شد. از آنجایی که مقادیر آزمون شاپیرو-ویلکز در هیچ یک از مراحل معنی‌دار نبود ( $P > 0.05$ )، لذا می‌توان نتیجه گرفت که توزیع نمرات نرمال می‌باشد. جهت بررسی همگنی واریانس‌ها نیز از آزمون لوین استفاده شد. طبق نتایج، شاخص آماره آزمون لوین در سه مرحله ارزیابی به لحاظ آماری معنی‌دار نبود ( $P > 0.05$ ) و بدین ترتیب پیش‌فرض برابر واریانس‌ها تایید شد. داده‌های تحقیق فرض همگنی ماتریس‌های واریانس-کوواریانس (امباکس) را زیر سوال نبرد؛ بنابراین این پیش‌فرض نیز رعایت شده است ( $P > 0.05$ ). از آنجایی که مقدار سطح معناداری آزمون کرویت موجلی برابر ۰/۰۰۱ به دست آمد که این یافته حاکی از آن است که پیش‌فرض تحلیل واریانس کرویت رعایت نمی‌شود. تخطی از پیش‌فرض کرویت سبب می‌شود که آماره F تحلیل واریانس دقیق نباشد. برای رفع این مشکل و افزایش دقت آماره F، درجه آزادی را با استفاده از دو روش گرین‌هاوس-گیسر<sup>۱</sup> و هیون-فلدت<sup>۲</sup> تصحیح می‌کنند. اگر مقدار اپسیلون بزرگتر از ۷/۷۵ باشد از تصحیح هیون-فلت و اگر اپسیلون کوچکتر از ۷/۷۵ باشد یا هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد کرویت وجود نداشته باشد از تصحیح گرین‌هاوس-گیسر استفاده می‌شود. در پژوهش حاضر مقدار اپسیلون برای شاخص گرین‌هاوس-گیسر از ۷/۷۵ کوچکتر است، لذا از اپسیلون گرین‌هاوس-گیسر استفاده شده است. بنابراین با در نظر گرفتن تصحیح گرین‌هاوس-گیسر در جدول ۴ نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر برای بررسی تفاوت نمونه پژوهش در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری گزارش شده است.

جدول ۴. نتایج اثرات بین آزمودنی و درون آزمودنی (تصحیح گرین‌هاوس-گیسر) خودجرحی

متغیرهای وابسته	منابع تغییر	F آماره	معنی داری	ضریب تاثیر	توان آماری
گروه		۳۴/۱۶۱	۰/۰۰۱	۰/۵۴۵	۰/۹۹۹
زمان		۲۷۹/۹۳۹	۰/۰۰۱	۰/۷۳۱	۰/۹۹۹
زمان×گروه		۶۷/۲۴۸	۰/۰۰۱	۰/۷۰۲	۰/۹۹۹
گروه		۱۱/۶۰۳	۰/۰۰۱	۰/۲۸۹	۰/۹۹۲
زمان		۱۷۱/۴۱۸	۰/۰۰۱	۰/۷۵۰	۰/۹۹۹
زمان×گروه		۴۲/۱۰۱	۰/۰۰۱	۰/۵۹۶	۰/۹۹۹
گروه		۳۱/۴۷۶	۰/۰۰۱	۰/۵۲۵	۰/۹۹۹
زمان		۳۸۸/۸۵۸	۰/۰۰۱	۰/۷۷۲	۰/۹۹۹
زمان×گروه		۹۱/۳۵۴	۰/۰۰۱	۰/۷۶۲	۰/۹۹۹

نتایج جدول ۴ نشان داد که درمان مبتنی بر شفقت خود و زوج درمانی هیجان‌مدار بر کاهش خودجرحی تاثیر معنادار دارد. در ادامه مقایسه‌ی دو به دوی میانگین تعديل مراحل آزمون (پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری) بر خودجرحی برای بررسی ماندگاری نتایج و شناسایی درمان موثرتر در مرحله پیگیری در جدول ۵ آمده است.

جدول ۵. نتایج آزمون تعقیبی بن‌فرونی خودجرحی برای بررسی ماندگاری نتایج و شناسایی درمان اثربخش‌تر

متغیرهای وابسته	مراحل	میانگین تعدیل شده	تفاوت مراحل	تفاوت میانگین	تفاوت مراحل	معناداری
پیش آزمون	۱۴/۳۰۰		۰/۰۰۱	۲/۲۶۷	پیش آزمون-پس آزمون	۰/۰۰۱
پس آزمون	۱۱/۹۳۳		۰/۰۰۱	۲/۳۵۰	پیش آزمون-پیگیری	۰/۰۰۱
پیگیری	۱۱/۹۵۰		۰/۰۰۱	-۰/۰۱۷	پس آزمون-پیگیری	۰/۹۹۹
پیش آزمون	۲۱/۵۵۰		۰/۰۰۱	۲/۴۵۰	پیش آزمون-پس آزمون	۰/۰۰۱
پس آزمون	۱۹/۱۰۰		۰/۰۰۱	۲/۴۱۷	پیش آزمون-پیگیری	۰/۰۰۱
پیگیری	۱۹/۱۳۳		۰/۰۰۱	-۰/۰۳۳	پس آزمون-پیگیری	۰/۹۸۳
پیش آزمون	۳۵/۸۵۰		۰/۰۰۱	۴/۸۱۷	پیش آزمون-پس آزمون	۰/۰۰۱
پس آزمون	۳۱/۰۳۳		۰/۰۰۱	-۴/۷۶۷	پیش آزمون-پیگیری	۰/۰۰۱
نمودار کل خودجرحی						

1. Greenhouse-Geisser correction

2. Huynh-Feldt correction

متغیرهای واسته	پیگیری	۳۱/۰۸۳	پس آزمون-پیگیری	تفاوت میانگین	-۰/۰۵۰	۰/۹۹۹
معناداری		گروههای مداخله	گروههای مقایسه	گروه کنترل	-۱/۰۸۳	-۰/۰۱
کارکردهای درون فردی	درمان شفقت خود	درمان هیجان مدار	درمان هیجان مدار	درمان هیجان مدار	-۱/۸۳۳	-۰/۰۱
کارکردهای بین فردی	درمان شفقت خود	درمان هیجان مدار	درمان هیجان مدار	درمان هیجان مدار	-۰/۸۶۷	-۰/۰۳۵
نمره کل خودجرحی	درمان شفقت خود	درمان هیجان مدار	درمان هیجان مدار	درمان هیجان مدار	-۱/۶۰۰	-۰/۰۰۱
	درمان هیجان مدار	گروه کنترل	گروه کنترل	گروه کنترل	-۱/۹۵۰	-۰/۰۰۱
	درمان هیجان مدار	۳/۴۳۳				-۰/۰۰۱

جدول ۵ نشان داد که نتایج درمانی ماندگار است و تفاوت میانگین گروه درمان هیجان مدار با گروه کنترل بیشتر از تفاوت میانگین درمان مبتنی بر شفقت خود با گروه کنترل است که این نشان دهنده آن است که زوج درمانی هیجان‌مدار اثربخشی بیشتری بر خودجرحی دارد.

## بحث و نتیجه‌گیری

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت خود و زوج درمانی هیجان‌مدار بر خودجرحی در زنان قربانی خشونت خانگی بود. نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر شفقت خود بر کاهش خودجرحی زنان قربانی خشونت خانگی موثر است. این یافته با نتایج تحقیقات ویلسون و همکاران (۲۰۱۷) و کیری و همکاران (۲۰۱۹) همسو بود که اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت خود را نشان داده‌اند. همچنین بر اساس جستجوی در ادبیات تجربی، یافته غیرهمسو با نتایج به دست آمده از این پژوهش یافت نشد. در تبیین اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت خود بر کاهش خودجرحی در زنان قربانی خشونت خانگی می‌توان گفت شفقت نوعی تأثیر از رنج دیگران و آگاهی یافتن از درد دیگران است به نحوی که فرد نسبت به خود احساس مهربانی پیدا می‌کند و مشتاق تسكین درد و رنج خود می‌شود (نف، ۲۰۲۳). همچنین شفقت خود نوعی همدلی و فهم غیر قضاوتی نسبت به دردها، رنج‌ها، اشتباهات و ناشایستگی‌های خود است، به نحوی که فرد با خودشفقت‌ورزی، تجرب تلح خود را به عنوان بخش بزرگتری از تجرب انسانی ببیند (گرم، ۲۰۲۳)، از سوی دیگر می‌توان گفت که با درمان مبتنی بر شفقت خود، زنان قربانی خشونت خانگی یاد می‌گیرند که با خود مهربان بوده و از توانایی ذهن‌آگاهی بیشتری برخوردار باشند و کمتر خود را قضاوت کنند و کمتر خود را مورد سرزنش قرار دهند. لذا این زنان با شرکت در جلیات درمان مبتنی بر شفقت خود، از میزان بیشتری از شفقت خود برخوردار می‌شوند. اما زنانی دارای شفقت به خود پایین‌تر هستند، دارای خودانتقادی و خودقضاوتی بیشتری نسبت به خود هستند و همین امر باعث می‌شود که در برابر خودآسیب‌رسانی و انجام کارهای غیرمعقول مستعد باشند. چرا که اینگونه زنان که نسبت به خود مهربان نبوده اکثر ناکامی‌ها و شکست‌ها را مختص خودشان می‌دانند. همچنین خودانتقادی ویژگی مشترک بین زنان دارای خودجرحی و زنان دارای شفقت به خود پایین است. در واقع می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که به علت پایین بودن سطح شفقت به خود، این زنان ممکن است عواطف منفی مانند شرم و گناه بیشتری را تجربه کرده و از خودجرحی برای تنظیم این عواطف استفاده کنند. اما با فراگرفتن فنون شفقت به خود مانند ذهن‌آگاه بودن، بهبود روابط و اشتراکات انسانی و دوری از انزوا، این خودآسیب‌رسانی در آنان کمتر می‌شود. لذا منطقی است گفته شود که درمان مبتنی بر شفقت خود بر کاهش خودجرحی در زنان قربانی خشونت خانگی موثر باشد.

نتایج نشان داد که زوج درمانی هیجان‌مدار بر کاهش خودجرحی زنان قربانی خشونت خانگی موثر است. این یافته با نتایج تحقیقات گرین و جانسون (۲۰۲۲)، مارن و همکاران (۲۰۲۲)، گل محمد و همکاران (۱۴۰۰) همسو بود که اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار را نشان داده‌اند. همچنین بر اساس جستجوی در ادبیات تجربی، یافته غیرهمسو با نتایج به دست آمده از این پژوهش یافت نشد. در تبیین اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر کاهش خودجرحی در زنان قربانی خشونت خانگی می‌توان گفت در فرایند زوج درمانی هیجان‌مدار، درمانگر به از بین بردن احساس نالمنی در زنان اقدام می‌کند و در نتیجه وقتی درمانگر چرخه تعاملی منفی که نمایانگر دلبستگی نایمن در زنان را شناسایی می‌کند و هیجان‌های همراه با این چرخه‌ها نیز توسط زنان شناسایی می‌شود و زنان توانایی خود را بهتر در زمینه روابط زناشویی بروز می‌دهند (مارن و همکاران، ۲۰۲۲) و باعث می‌شود که زنان مشکلات ناشی از خشونت خانگی تجربه شده با شوهر خود را با ایجاد دلبستگی این‌تر کمتر کنند و زمانی که دلبستگی این‌من در آنان ایجاد شود نسبت به نیازهای همدیگر پاسخگوتر هستند و وقتی همسران نسبت به نیازهای همدیگر پاسخگو باشند روابط زناشویی آنها ایده‌آل‌تر شود و در موقع بروز مشکلات کمتر خشونت‌ورزی کنند. از آنجایی که در هنگام خشونت‌ورزی زناشویی، زنان به دلیل ضعیفتر بودن، بیشتر مورد حملات فیزیکی از سوی شوهر قرار می‌گیرد، لذا قربانی خشونت خانگی، بیشتر زنان هستند، و وقتی نتوانند در برابر

خشونت خانگی مقاومت کنند و بحث به دلیل نبود حمایت‌های اجتماعی به ویژه نبود حمایت‌های خانوادگی مجبور به ادامه زندگی با شوهر خود هستند، برای آرام کردن خود ممکن است آسیب‌هایی به خود بزنند. به همین دلیل این زنان با شرکت در جلسات زوج درمانی هیجان‌مدار زنان می‌توانند نیازهای خود را به راحتی ابراز کنند و نیازهای دلبستگی همسر خود را بدپذیرند که این موضوع باعث کاهش مشکلات هیجانی و بهبود خشونت‌ورزی خانوادگی بین همسران می‌شود. بنابراین هدف از این شیوه درمانی، کمک به زنان قربانی خشونت خانگی برای دستیابی به هیجان‌های نهفته و تسهیل تعاملات مثبتی است که در دسترس بودن و اعتماد بین همسران را افزایش می‌دهد و همین باعث می‌شود که صمیمیت بیشتری را نیز در بین خود و در زندگی زناشویی خود تجربه کنند و رفتارهای خودآسیب‌رسان یا خودجرحی را در خود کاهش دهند. لذا منطقی است گفته شود که زوج درمانی هیجان‌مدار بر کاهش خودجرحی در زنان قربانی خشونت خانگی موثر باشد.

در نهایت، نتایج نشان داد که زوج درمانی هیجان‌مدار نسبت به درمان مبتنی بر شفقت خود اثربخشی بیشتری بر کاهش خودجرحی زنان قربانی خشونت خانگی دارد. گرچه پژوهشی مبنی بر مقایسه این دو مداخله وجود ندارد که نشان داده باشد زوج درمانی هیجان‌مدار نسبت به درمان مبتنی بر شفقت خود موثرter است. اما این یافته با نتایج تحقیقات گریمن و جانسون (۲۰۲۲)، مارن و همکاران (۲۰۲۲)، گل محمد و همکاران (۱۴۰۰) همسو است که اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار را نشان داده‌اند. همچنین بر اساس جستجوی در ادبیات تجربی، یافته غیرهمسو با نتایج به دست آمده از این پژوهش یافت نشد. در تبیین موثرter بودن زوج درمانی هیجان‌مدار نسبت به درمان مبتنی بر شفقت خود بر کاهش خودجرحی در زنان قربانی خشونت خانگی می‌توان گفت زوج درمانی هیجان‌مدار به بازگشت آرامش به زندگی زوجین مشکل‌دار و متعارض در جهت حفظ و تداوم رابطه زناشویی کمک می‌نماید. چرا که زوج درمانی هیجان‌مدار منجر به بهبود سبک دلبستگی اینمین بین زوجین می‌شود و آنها نسبت به نیازهای همدیگر پاسخگو‌تر بوده و همدۀ طلبی همسران را بهبود می‌بخشد (گریمن و جانسون، ۲۰۲۲) و همین عوامل باعث می‌شود که در کانون زندگی زناشویی خشونت زناشویی کمتری را تجربه کنند. افزون بر آن، زوج درمانی هیجان‌مدار به همسران در گیر مشکلات زناشویی مانند خشونت خانگی کمک می‌کند تا دوباره با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، چرا که زنان قربانی خشونت خانگی با شرکت در جلسات درمانی یاد می‌گیرند که میزان آشفتگی در کانون خانواده را مدیریت کنند و از این طریق علاقه بیشتر و روابط صمیمانه بیشتری را در کانون خانواده ایجاد کنند که همین وضعیت سبب می‌شود که زنان کمتر خشونت خانگی را از سوی همسر خود تجربه کنند. همچنین در تبیین اثربخشی بیشتر زوج درمانی هیجان‌مدار نسبت به درمان مبتنی بر شفقت خود بر کاهش خودجرحی زنان زنان آسیب دیده از خشونت خانگی می‌توان گفت که این زنان با شرکت در جلسات زوج درمانی هیجان‌مدار میزان دلبستگی نایمین خود را تغییر داده و سعی می‌کنند اینمین بدن دلبستگی را در زندگی زناشویی خود تجربه کنند و همین فرآیند به آنان کمک می‌کند در زندگی زناشویی ارتباطات بهتری را همسر خود داشته باشد و در موقع مشکلات زناشویی و بروز تعارضات و اختلالات زناشویی، خشونت خانگی کمتری بین زوجین رخ دهد و زمانی که میزان خشونت از سوی مردان نسبت زنان کمتر باشد، چون برخی زنان راهی برای برونو رفت از این موقعیت را ندارند به دلیل توانمندی به وجود آمده که در جلسات زوج درمانی هیجان‌مدار تجربه کرده‌اند کمتر به خودآسیب می‌رسانند. اما درمان مبتنی بر شفقت خود از آنجایی که بیشتر بر روی جنبه‌های فردی خود زنان کار می‌کند و آنان را نسبت به رنج و دردی که دارند، با خودشان دلسوز و مهربان بار می‌آورند، زیاد برای توانمندی هر دو همسر نمی‌پردازد و تنها زنان را نسبت به خود مهربان تر می‌کنند. لذا به همین دلیل است که زوج درمانی هیجان‌مدار نسبت به درمان مبتنی بر شفقت خود موثرter است. لذا منطقی است گفته شود که زوج درمانی هیجان‌مدار نسبت به درمان مبتنی بر شفقت خود بر کاهش خودجرحی در زنان قربانی خشونت خانگی اثربخش تر باشد.

به طور کلی نتایج نشان داد در پس‌آزمون خودجرحی بین زوج درمانی هیجان‌مدار نسبت به درمان مبتنی بر شفقت خود تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین زوج درمانی هیجان‌مدار نسبت به درمان مبتنی بر شفقت خود با گروه کنترل تفاوت معنادار آماری گزارش شد. به عبارتی زوج درمانی هیجان‌مدار نسبت به درمان مبتنی بر شفقت خود بر کاهش خودجرحی اثر داشته‌اند و این دو مداخله تفاوت معناداری از نظر اثربخشی بر خودجرحی داشته است؛ این نتایج در پیگیری هر دو مداخله نیز دیده شد. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود زوج درمانی هیجان‌مدار نسبت به درمان مبتنی بر شفقت خود توانستند خودجرحی را کاهش دهند؛ اما زوج درمانی هیجان‌مدار در کاهش خودجرحی موثرter عمل کرد؛ از این‌رو زوج درمانی هیجان‌مدار می‌تواند در درمان زنان قربانی خشونت خانگی تقدیم داشته باشد و توسط روان درمانگران و خانواده درمانگران برای بهبود مشکلات زنان قربانی خشونت خانگی به کار گرفته شود.

از محدودیت‌های پژوهش حاضر می‌توان به روش نمونه‌گیری هدفمند، عدم کنترل شدت خودجرحی و خشونت خانگی و حجم پایین نمونه اشاره کرد. پیشنهاد می‌گردد در پژوهش‌های آتی از نمونه‌گیری تصادفی و حجم بیشتر برای نمونه‌گیری استفاده شود. همچنین پیشنهاد می‌شود شدت خودجرحی مشخص شود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر مبتنی بر اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت خود و زوج درمانی هیجان‌مدار بر خودجرحی در زنان قربانی خشونت خانگی، پیشنهاد می‌شود مراکز مشاوره و درمانی با هدف ارتقاء تاب‌آوری زناشویی و کاهش مشکلات زوجین

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت خود و زوج درمانی هیجان‌مدار بر خودجرحی در زنان قربانی خشونت خانگی  
Comparison of Effectiveness of Self-Compassion Therapy and Emotionally Focused Therapy on Self-Injury of Women ...

و همچنین افزایش روابط صمیمانه، دوره‌های درمانی هیجان‌مدار را در قالب گروهی یا فردی در نمونه‌های بالینی یا عمومی اجرا نمایند که بتواند زوجین در برابر مشکلات زناشویی تاب‌آوری داشته باشند و کمتر درگیر خودجرحی شوند.

## منابع

- احمدی، م.، رهنوردی، م.، کیانی، م.، پورحسین قلی، ا. (۱۳۹۳). بررسی ارتباط خشونت‌های خانگی و افکارخودکشی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی و دادگاه‌های خانواده. مجله پژوهشی قانونی، ۲۰(۴)، ۲۰۱-۲۰۹.
- قرهداغی، ع.، همنگ، ا.، و رحیمی، س. (۱۴۰۰). مطالعه کیفی احساسات گناه و شرم انتقال یافته از والدین به نوجوانان پسر دارای سابقه خودزنی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، ۲۲(۲)، ۱۱۱-۱۰۱.
- گل محمد، ر.، قاسمی فیروزآبادی، م.، عبدالی، ز.، و ساقی‌ها، ه. (۱۴۰۰). اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر پریشانی روان‌شناسختی و افسردگی زنان متاهل قربانی خشونت خانگی. مجله دانشکده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۶۴(۶)، ۴۳۴۸-۴۳۳۸.
- لطفی، س.، پیوسته‌گر، م.، خسروی، ز.، خدابخش پیرکلانی، ر.، و مهری‌نژاد، ا. (۱۴۰۰). ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس اظهارات مربوط به خودآسیبی در دانشجویان. مجله علوم روانشناسختی، ۲۱(۱۱۰)، ۳۳۶-۳۲۱.
- ولی‌زاده، ح.، و احمدی، و. (۱۴۰۰). مقایسه شناختی ارتقای و درمان پذیرش تعهد بر تاب‌آوری و کیفیت زندگی زنان قربانی خشونت. روانشناسی خانواده، ۸(۲)، ۲۵-۱۲.
- Allen, S., Hawkins, A. J., Harris, S. M., Roberts, K., Hubbard, A., & Doman, M. (2022). Day-to-day changes and longer-term adjustments to divorce ideation: Marital commitment uncertainty processes over time. *Family Relations*, 71 (2), 611-629. <https://doi.org/10.1111/fare.12599>
- Blackwell, A. H., Asghar, K., de Dieu Hategikimana, J., Roth, D., O'Connor, M., & Falb, K. (2023). Family functioning in humanitarian contexts: correlates of the feminist-grounded family functioning scale among men and women in the eastern Democratic Republic of Congo. *Journal of Child and Family Studies*, 32 (1), 197-210. <https://doi.org/10.1007/s10826-022-02356-4>
- Carvalho, S., Martins, C. P., Almeida, H. S., & Silva, F. (2017). The evolution of cognitive behavioural therapy—The third generation and its effectiveness. *European Psychiatry*, 41 (S1), 773-774. <https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2017.01.1461>
- Catino, M., Rocchi, S., & Marzetti, G. V. (2022). The network of interfamily marriages in'Ndrangheta. *Social Networks*, 68 (1), 318-329. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2021.08.012>
- Craig, C., Hiskey, S., & Spector, A. (2020). Compassion focused therapy: A systematic review of its effectiveness and acceptability in clinical populations. *Expert Review Of Neurotherapeutics*, 20 (4), 385-400. <https://doi.org/10.1080/14737175.2020.1746184>
- Dew, J., Trujillo, S., & Saxe, M. (2022). Predicting marital financial deception in a national sample: A person-centered approach. *Family Relations*, 1 (2), 1-10. <https://doi.org/10.1111/fare.12654>
- Germer, C. (2023). Self-Compassion in Psychotherapy: Clinical Integration, Evidence Base, and Mechanisms of Change. In *Handbook of Self-Compassion* (pp. 379-415). Cham: Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-22348-8\\_22](https://doi.org/10.1007/978-3-031-22348-8_22)
- Gilbert, P. (2000). Internal 'social'conflict and the role of inner warmth and compassion in cognitive therapy. *Genes on the Couch: Explorations in Evolutionary Psychotherapy*, 118-150. <https://psycnet.apa.org/record/2001-16368-006>
- Gilbert, P. (2010). An introduction to compassion focused therapy in cognitive behavior therapy. *International Journal of Cognitive Therapy*, 3 (2), 97-112. <https://doi.org/10.1521/ijct.2010.3.2.97>
- Greenman, P. S., & Johnson, S. M. (2022). Emotionally focused therapy: Attachment, connection, and health. *Current Opinion in Psychology*, 43 (2), 146-150. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.06.015>
- Johnson, S. M. (2008). Emotionally focused couple therapy. *Clinical Handbook of Couple Therapy*, 1-127. <https://books.google.com/books?hl=en&q=978-1-4641-1180-1>
- Johnson, S. M. (2012). *The practice of emotionally focused couple therapy: Creating connection*. Routledge.
- Kirby, J. N., Tellegen, C. L., & Steindl, S. R. (2017). A meta-analysis of compassion-based interventions: Current state of knowledge and future directions. *Behavior Therapy*, 48 (6), 778-792. <https://doi.org/10.1016/j.beth.2017.06.003>
- Klonsky, E. D., & Glenn, C. R. (2009). Assessing the functions of non-suicidal self-injury: Psychometric properties of the Inventory of Statements About Self-injury (ISAS). *Journal of psychopathology and behavioral assessment*, 31 (3), 215-219. <https://doi.org/10.1007/s10862-008-9107-z>
- Klonsky, E. D., & Glenn, C. R. (2009). Assessing the functions of non-suicidal self-injury: Psychometric properties of the Inventory of Statements About Self-injury (ISAS). *Journal of psychopathology and behavioral assessment*, 31 (3), 215-219. <https://doi.org/10.1007/s10862-008-9107-z>
- Leichsenring, F. (1999). Development and first results of the Borderline Personality Inventory: A self-report instrument for assessing borderline personality organization. *Journal of Personality Assessment*, 73(1), 45-63. <https://doi.org/10.1207/S15327752JPA730104>
- Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). *Depression Anxiety Stress Scales (DASS--21, DASS--42)* [Database record]. APA PsycTests. <https://doi.org/10.1037/01004-000>
- Lu, F., Huang, X., Xu, E., Chung, C. N., & He, X. (2022). Instrumental love: Political marriage and family firm growth. *Management and Organization Review*, 18 (2), 279-318. <https://doi.org/10.1017/mor.2021.75>
- Maren, C., Mikoška, P., O'Brien, S., & Timulak, L. (2022). A qualitative meta-analysis of the clients' experiences of emotion-focused therapy. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 29 (5), 1611-1625. <https://doi.org/10.1002/cpp.2745>
- Neff, K. D. (2023). Self-compassion: Theory, method, research, and intervention. *Annual Review of Psychology*, 74 (2), 193-218. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-032420-031047>
- Olding, J., Zisman, S., Olding, C., & Fan, K. (2021). Penetrating trauma during a global pandemic: changing patterns in interpersonal violence, self-harm and domestic violence in the Covid-19 outbreak. *The Surgeon*, 19 (1), 9-13. <https://doi.org/10.1016%2Fj.surge.2020.07.004>
- Wilson, A. C., Mackintosh, K., Power, K., & Chan, S. W. (2019). Effectiveness of self-compassion related therapies: A systematic review and meta-analysis. *Mindfulness*, 10 (1), 979-995. <https://doi.org/10.1007/s12671-018-1037-6>