

مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان مبتنی بر شفقت بر سوگ پیش از موعد و پریشانی روانشناختی مراقبین بیماران مبتلا به سرطان

Comparing the Effectiveness of Emotion-Oriented Therapy and Compassion-Based Therapy on Premature Bereavement and Psychological Distress of Caregivers of Cancer Patients

Faezeh Tourani

PhD student in Psychology, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.

Dr. Hakimeh Aghaee *

Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran. hakimehaghae85@gmail.com

Dr. Shahnaz Nouhi

Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.

Dr. Seyed Mosa Tabatabae

Assistant Professor, Department of Cognitive Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

فائزه تورانی

دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، واحد شاهروود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهروود، ایران.

دکتر حکیمه آقایی (نویسنده مسئول)

استادیار، گروه روانشناسی، واحد شاهروود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهروود، ایران.

دکتر شهرناز نوحی

استادیار، گروه روانشناسی، واحد شاهروود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهروود، ایران.

دکتر سید موسی طباطبائی

استادیار گروه علوم شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

Abstract

The present study aimed to compare the effectiveness of emotion-oriented therapy and compassion-based therapy on premature bereavement and psychological distress of caregivers of cancer patients. The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design and a control group with a three-month follow-up period. The statistical population of the research was the caregivers of cancer patients admitted to Imam Hossein and Bahar hospitals in Shahrood City in 2022. 45 people were selected by available sampling and randomly divided into 3 groups (15 people in each group). The research tools included premature bereavement questionnaires (MM-CGI) by Dehghani et al. (2012), and psychological distress (K-10) by Kessler (2003). One of the experimental groups received emotion-oriented therapy in 10 1-hour sessions, and the other experimental group received compassion-based therapy in the form of 10 1-hour sessions twice a week. Analysis of variance with repeated measures was used to analyze the data. The findings showed that emotion-oriented therapy and compassion-based therapy had a significant effect on premature bereavement and psychological distress ($p<0.05$). Also, emotion-oriented therapy has been more effective in reducing premature grief and psychological distress of caregivers of cancer patients compared to compassion-based therapy ($p<0.01$). The results showed that emotion-oriented therapy was a more efficient intervention compared to compassion-based therapy for reducing premature grief and psychological distress of caregivers of cancer patients.

Keywords: Psychological Distress, Compassion-Based Therapy, Emotion-Focused Therapy, Premature Bereavement, Cancer.

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان مبتنی بر شفقت بر سوگ پیش از موعد و پریشانی روانشناختی مراقبین بیماران مبتلا به سرطان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش مراقبت‌کنندگان بیماران مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان‌های امام حسین و بهار شهرستان شاهروود در سال ۱۴۰۱ بودند. تعداد ۴۵ نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در ۳ گروه (هر گروه ۱۵ نفر) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های سوگ پیش از موعد (MM-CGI) دهقانی و همکاران (۱۳۹۱)، پریشانی روانشناختی (K-10) (۲۰۰۳) بود. یکی از گروه‌های آزمایش درمان هیجان مدار را در ۱۰ جلسه ۱ ساعته و گروه آزمایش دیگر نیز درمان مبتنی بر شفقت را در قالب جلسه ۱ ساعته به صورت هفت‌ای دو بار دریافت کردند. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که درمان هیجان مدار و درمان مبتنی بر شفقت بر سوگ پیش از موعد و پریشانی روانشناختی اثربخشی معنادار داشتند ($p<0.05$). همچنین درمان هیجان مدار در مقایسه با درمان مبتنی بر شفقت بر کاهش سوگ پیش از موعد و پریشانی روانشناختی مراقبین بیماران مبتلا به سرطان اثربخشی بیشتری داشته است ($p<0.01$). نتایج نشان داد که درمان هیجان مدار، مداخله کارآمدتری در مقایسه با درمان مبتنی بر شفقت برای کاهش سوگ پیش از موعد و پریشانی روانشناختی مراقبین بیماران مبتلا به سرطان بوده است.

واژه‌های کلیدی: پریشانی روانشناختی، درمان مبتنی بر شفقت، درمان هیجان مدار، سوگ پیش از موعد، سرطان.

مقدمه

سرطان^۱ یکی از جدی‌ترین بیماری‌های مزمن و از عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه به شمار می‌رود و هزینه‌های اقتصادی زیادی را بر آن تحمیل می‌کند (تیان^۲ و همکاران، ۲۰۲۴). سرطان شاخه‌ای از بیماری‌های است که در آن گروهی از سلول‌های بدن دچار تکثیر غیرکنترل شده می‌شوند و می‌توانند در مراحل بعدی به دیگر بافت‌ها و ارگان‌ها مجاور حمله‌ور شوند و سرانجام موجب گسترش در کل بدن از طریق سیستم لنفاوی و عروق خونی شوند (اریانوس^۳ و همکاران، ۲۰۲۴). بیماران مبتلا به سرطان از نگرانی و اضطراب فوق‌العاده‌ای در مراحل اولیه عالجات خود رنج می‌برند. فشارهای روانی ناشی از سرطان برای خانواده و مراقبت کنندگان آنها به شدت چالش برانگیز هستند (تیو^۴ و همکاران، ۲۰۲۳). تشخیص سرطان و به دنبال آن تحمل درمان‌های طولانی و فشرده معمولاً یک تجربه استرس‌زا به حساب می‌آید. این بیماری در سطح خانوادگی بر سلامت جسمی و روانی مراقبان نیز تاثیر می‌گذارد (حسن‌زاده و همکاران، ۱۳۹۸).

برخی از مطالعات از این باور حمایت می‌کنند خانواده‌هایی که در رنج فرد مبتلا به سرطان شریک هستند ممکن است دچار سوگ پیش از موعد^۵ شوند (اسکویی و همکاران، ۱۴۰۰). سوگواری به دنبال مرگ عزیزان، فرایندی طبیعی و لازم است که بسیاری از افراد آن را تجربه می‌کنند؛ ولی گروهی نیز مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای حل مشکل سوگ را ندارند که این می‌تواند منشأ بسیاری مشکلات دیگر گردد (اورارد^۶ و همکاران، ۲۰۲۱). یکی از انواع سوگ که خانواده‌های افراد با بیماری‌های خاص درگیر آن می‌باشند، سوگ پیش از موعد است (یو^۷ و همکاران، ۲۰۲۱). سوگ پیش از موعد، غم ناشی از مرگ تدریجی یک فرد دوست داشتنی است که به هنگام وقوع فقدان حقیقی پایان می‌یابد و در ملايم کردن ضربه روحی پس از مرگ مفید می‌باشد (سبحانی، ۱۴۰۰). از سوی دیگر وقتی سال‌ها قبل از مرگ، جدایی اتفاق افتاده باشد، ممکن است هنگام مرگ واکنشی دیگر رخ دهد و احساس فقدان تشدید شود (گلیک^۸ و همکاران، ۲۰۱۸). بر اساس مطالعات، تجربه روانشناختی مراقبان شامل افسردگی، اضطراب، عصبانیت، ترس، نگرانی و احساس پریشانی همراه است (عدیلی و همکاران، ۱۳۹۷).

مواجهه با سرطان به خودی خود می‌تواند به عنوان یک حادثه تنشی‌زا، جنبه‌های مختلف سلامت فردی بیمار از جمله سلامت جسمی، روانی و خانوادگی وی را به خطر بیندازد و سبب ایجاد پریشانی روانشناختی^۹ برای مراقبت کنندگان از بیماران مبتلا به سرطان گردد (بنی‌اسدی و همکاران، ۱۴۰۰). پریشانی روانشناختی برای توصیف دوره‌ای کوتاه‌مدت اما حاد از یک آشفتگی خاص روانی به کار می‌رود که ابتدا با مشخصه‌های افسردگی یا اضطراب تظاهر می‌کند و می‌تواند نوعی نابهنجاری تلقی شود که مسئول تفکر و رفتار ناسازگارانه بوده و نیازمند مداخله تخصصی است (سونگ^{۱۰} و همکاران، ۲۰۲۲) در این شرایط شور و شوق زندگی کاهش یافته، احساس دلشکستگی و نالمیدی به حاکمیتی غالب تبدیل می‌گردد (احمدی و همکاران، ۱۴۰۰).

با توجه به این که مراقبت کنندگان گروهی هستند که از نظر جسمی و روحی آسیب‌پذیر می‌باشند، در صورت حل نشدن مشکلات آنها، این منبع مراقبتی دچار فرسودگی جسمی و روحی می‌شود و کارایی خود را برای انجام فعالیت‌های مراقبتی از دست می‌دهد (طهرخانی و همکاران، ۱۴۰۰). برخی از انواع درمان‌ها می‌تواند به تنظیم افکار و اعمال برقراری ارتباط بهتر، مهارت‌های حل مساله و مدیریت علائم بیماری کمک کند. یکی از درمان‌های پیشنهادی درمان هیجان‌دار^{۱۱} است (ثنایکوی محرز و همکاران، ۱۳۹۸)، که با هدف قوی کردن خود، تنظیم هیجان و ایجاد معنی جدید در مراجع به کار گرفته می‌شود. در این درمان و بر پایه یک رابطه اینمن درمانی، با افزایش آگاهی و پردازش مجدد هیجان‌ها به رشد فردی و توانمندسازی فرد کمک می‌شود (الیوت و مکدونالد^{۱۲}، ۲۰۲۱). مطالعات نقدندر و همکاران (۱۴۰۱) نشان داد که درمان هیجان‌دار بر انعطاف‌پذیری کنشی و اضطراب مرگ بیماران قلی اثربخش است. همچنین

1 .cancer

2 .Tian

3 .Irenaeus

4 .Tu

5 .Premature mourning

6 .Everard

7 .Yu

8 .Glick

9 .Psychological distress

10 .Song

11 .emotion-focused therapy

12 .Elliott & McDonald

یافته‌های پژوهش داج و راتاناسیرپنگ^۱ (۲۰۱۹) حاکی از اثربخش بودن درمان هیجان‌مدار بر تحمل ناکامی و بهبود آشفتگی زنان است. نتایج مطالعات حسین‌زاده و همکاران (۱۳۹۹)، فقیه و کاظمی (۱۳۹۷)، ونوج^۲ و همکاران (۲۰۲۱)، مارش^۳ و همکاران (۲۰۲۱) نشان دهنده اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر پریشانی روانشناختی و پژوهش‌های علی‌بور (۱۳۹۵) نشان داد که درمان هیجان‌مدار بر واکنش به سوگ اثربخش است.

یکی دیگر از راههایی که به نظر می‌رسد برای کاهش پیامدهای روانشناختی منفی مراقبین بیمار مبتلا به سرطان موثر باشد، استفاده از رویکرد درمانی متمرکز بر شفقت^۴ است (طبیب‌زاده و همکاران، ۱۳۹۹). محور اصلی این درمان، پرورش ذهن شفقت‌ورز است؛ از این رو درمانگر از طریق ایجاد و افزایش یک رابطه شفقت‌ورز درونی مراجعان با خودشان، به جای سرزنش کردن، محکوم کردن، و یا خودانتقادی، به آنها کمک می‌کنند (جوهانسن^۵ و همکاران، ۲۰۲۲). یه عبارت دیگر درمان مبتنی بر شفقت نوعی راهبرد هیجان‌محور است، چرا که مراجعان را نسبت به هیجان خود آگاه می‌کند (آیرون و لاد، ۲۰۱۹). مطالعات نشان داده که افرادی که از شفقت بالاتری نسبت به خود برخوردارند، سطوح پایین افسردگی، اضطراب و نشخوار را در موقعیت‌های اجتماعی چالش‌برانگیز تجربه می‌کنند و از رضایت‌زندگی بالاتری نیز برخوردارند (کیارسی، عمامیان و حسن‌زاده، ۱۴۰۰). در این راستا نتایج مطالعات آذری و همکاران (۱۴۰۰)، خلعتبری و همکاران (۱۳۹۹)، باراندی و کازیا^۶ (۲۰۲۲)، ورابل^۷ و همکاران (۲۰۲۱) نشان دهنده اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر پریشانی روانشناختی و مطالعات عبدی (۱۳۹۸) نشان دهنده اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر سوگ بود.

افزایش فشار بر مراقبت‌کنندگان از بیماران باعث کاهش و نقصان در امر مراقبت از بیمار و زمینه‌ساز بروز مسایلی همچون ادرارک زیاد فشار مراقبتی، افت کیفیت‌زندگی و در نهایت، نادیده گرفتن بیمار و سهل‌انگاری در امر مراقبت از سوی مراقبان می‌گردد. با توجه به این که مراقبت‌کنندگان گروهی هستند که از نظر جسمی و روانی آسیب‌پذیر می‌باشند، در صورت حل نشدن مشکلات آنها، این منبع مراقبتی دچار فرسودگی جسمی و روحی می‌شود و کارایی خود را برای انجام فعالیت‌های مراقبتی از دست می‌دهد. بدین‌سان این موضوع دارای اهمیت است که درمان‌های موثر بر وضعیت روانشناختی مراقبین بیماران مبتلا به سرطان مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد تا بتوان با به کارگیری این درمان‌ها در سطح گسترده از بروز و یا تشید مشكلات روانشناختی این مراقبت‌کنندگان پیشگیری به عمل آورده و در نهایت کیفیت‌زندگی ایشان را بهبود بخشد، با توجه به مطالب ارائه شده، این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان مبتنی بر شفقت بر سوگ پیش از موعده و پریشانی روانشناختی، مراقبین بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.

روش

روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل با دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش تمامی مراقبت‌کنندگان از بیماران مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان‌های امام حسین و بهار شهرستان شاهرود در سال ۱۴۰۱ بودند. با توجه به آن که دلاور (۱۳۹۱) حجم نمونه برای تحقیقات آزمایشی را ۱۵ نفر در هر گروه پیشنهاد کرده‌اند؛ تعداد ۴۵ نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در ۳ گروه (هر گروه ۱۵ نفر) قرار گرفتند. ملاک‌های ورود به پژوهش عبارت بودند از: رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش، گذشت حداقل ۶ ماه از مراقبت از بیمار مبتلا به سرطان، حداقل تحصیلات دیپلم، عدم دریافت وجه در قبال مراقبت، دامنه سنی ۳۰ تا ۵۰ سال، عدم وجود اختلالات روانپزشکی شناخته شده، عدم مصرف داروهای روانپزشکی طبق مصاحبه بالینی بود و ملاک‌های خروج از پژوهش، عدم تکمیل پرسشنامه‌ها، غیبت بیش از دو جلسه، فوت فرد مبتلا به سرطان و دریافت مداخلات روانشناختی دیگر بود. اخذ رضایت آگاهانه، رعایت اصل رازداری، آگاه کردن شرکت‌کنندگان از اهداف مطالعه، اختیاری بودن شرکت در مطالعه، حق انصراف از مطالعه در هر زمان از ملاحظه اخلاقی رعایت شده در پژوهش بود. همچنین به افراد گروه گواه اطمینان داده شد که آنان نیز پس از اتمام فرآیند پژوهشی این مداخلات را دریافت خواهند نمود.. این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول،

1. Dutch & Ratanasirpeng

2. Vanog

3. march

4. Compassion-focused therapy

5. Johansen, Schelander, Westergaard

6. Iron & Lad

7. Barandi and Kazia

8. Worrabl

در رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهروд با کد اخلاق (IR.IAU.SHAHROOD.REC.1402.006) است. به جهت حفظ رعایت اصول اخلاقی در این پژوهش سعی شد تا جمع‌آوری اطلاعات پس از جلب رضایت شرکت‌کنندگان انجام شود. مشارکت کنندگان آگاهانه و داوطلبانه در پژوهش مشارکت نمودند و پژوهشگران خطری برای مشارکت کنندگان متوجه نیستند. در نهایت، جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ استفاده شد

ابزار سنجش

پرسشنامه سوگ پیش از موعد (MM-CGI): این پرسشنامه توسط دهقانی نیشاپوری در سال (۱۳۹۱) برای افرادی که فرزند بیمار دارند یا یکی از نزدیکانشان با بیماری سختی همچون سرطان درگیر است ساخته شد و دارای ۵۰ گویه است که میزان سوگ پیش از موعد را در فرد برسی و ارزیابی می‌کند. نمره‌گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۵ درجه‌ای و از خیلی موافق تا خیلی مخالف می‌باشد. نمره گذاری گویه‌های ۴۷-۳۵-۲۲-۸ معکوس است. امتیازات پرسشنامه از ۵۰ عبارت با یکدیگر جمع می‌شود، حداقل امتیاز ممکن ۵۰ و حداً کثر ۲۵۰ است. نمره بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میزان سوگ پیش از فرد ضعیف است. نمره بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میزان سوگ پیش از موعد در فرد متوسط است. نمره بالاتر از ۱۵۰ میزان سوگ پیش از موعد در فرد قوی است. روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه فردوسی مشهد تایید شده است. همچنین پایابی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بالای ۰/۸۵ به دست آمد. در پژوهش سبحانی (۱۴۰۰) پایابی پرسشنامه سوگ پیش از موعد به روش آلفای کرونباخ ۰/۸۰ به دست آمد. پایابی پرسشنامه در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ ۰/۸۷ به دست آمد.

پرسشنامه پریشانی روانشناسی (K-10): پرسشنامه پریشانی روانشناسی توسط کسلر^۳ و همکاران در سال ۲۰۰۳ به صورت ۱۰ سوالی تنظیم شد. پاسخ سوالات به صورت ۵ گزینه‌ای تمام اوقات=۳، بیشتر اوقات=۲، بعضی اوقات=۱، به ندرت=۰ و هیچ وقت=۰ است که بین ۰-۱۰ نمره گذاری می‌شود. بر این اساس حداقل نمره در این پرسشنامه صفر و حداً کثر نمره برابر ۴۰ است. کسب نمره بالاتر نشان‌دهنده پریشانی روانشناسی بیشتر است. اندرسون^۴ و همکاران (۲۰۱۱) روایی ملکی پرسشنامه پریشانی روانشناسی کسلر با پرسشنامه سلامت عمومی ۰/۷۸ و پایابی را از طریق آلفای کرونباخ ۰/۸۵ گزارش کردند. یعقوبی (۱۳۹۴) هم روایی سازه‌های تاییدی پرسشنامه را مطلوب و همبستگی سوالات با کل آزمون را ۰/۷۴ گزارش کرده است؛ همچنین پایابی تصنیف و اسپیرمن-براؤن ۰/۹۱ به دست آمد. در پژوهش رمضانی و بختیاری (۱۳۹۷) نیز پایابی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۵ به دست آمد. پایابی پرسشنامه در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ ۰/۸۵ به دست آمد.

گروه آزمایش ۱ بر مبنای درمان هیجان مدار لسلی گرینبرگ^۵ (۲۰۱۰) در قالب ۱۰ جلسه ۱ ساعته، هفت‌های دو بار آموزش دیدند که خلاصه آن در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱. خلاصه جلسات درمان هیجان مدار لسلی گرینبرگ (۲۰۱۰)

جلسات	محتوی
اول	آشنایی و بیان اهداف و روش انجام کار برقراری رابطه درمانی هم‌دلاه و ایجاد تعهد در درمان خلق رابطه ایمن با پذیرش مثبت نامشروع
دوم	کشف تعاملات مشکل‌دار و شناسایی چرخه‌های تعاملی منفی آشفته‌ساز
سوم	ایجاد فضای امن ارتباطی اعضای گروه؛ کشف و شناسایی احساسات زیربنایی و ابراز نشده؛ کشف ترس‌ها و نایمنی‌های اساسی.
چهارم	شکل‌دهی مجدد چرخه تعاملات، روشن ساختن پاسخ‌های هیجانی کلیدی.
پنجم	پذیرش احساسات تعریف نشده، شناسایی نیازهای دلیستگی انکار شده هیجانات تلفیق نیازها با تعاملات.
ششم	تملک هیجانات، افزایش پذیرش پاسخ‌های تعاملی جدید.
هفتم	بازسازی و تسهیل راه حل‌های جدید برای مشکلات کهنه و قدیمی.

1. Premature bereavement questionnaire

2. Psychological distress questionnaire

3. Kessler

4. Anderson

5. Leslie Greenberg

شناسایی و کار بر روی وقفه‌ها یا انسدادهای دسترسی به هیجانات اولیه و ثانویه و تجربه.	هشتم
ردگیری و شناسایی موضوعات و تصاویر ابزه‌ای از مشکل کنونی و مرتبط کردن آن با تصاویر خود، پدر، مادر و یا سایر ابزه‌های احتمالی	نهم
بحث و نتیجه‌گیری و اجرای پس‌آزمون.	دهم

گروه آزمایش ۲ بر مبنای درمان متمرکز بر شفقت گیلبرت^۱ (۲۰۱۰) در قالب ۱۰ جلسه ۱ ساعته، هفتاهی دو بار آموزش دیدند که خلاصه آن در جدول ۲ ارائه شده است.

جدول ۲. خلاصه جلسات درمان متمرکز بر شفقت گیلبرت (۲۰۱۰)

جلسات	شرح جلسات
اول	اجرای پیش آزمون، آشنایی درمانگر و اعضا گروه با یکدیگر، آشنایی با اصول کلی درمان متمرکز بر شفقت.
دوم	مرور جلسه قبل و بررسی نوع برخورد اعضا با خود (سبک انتقادگر و با شفقت‌گر)، تعریف خود انتقادی و علل و پیامدهای آن.
سوم	بررسی تکلیف و مرور جلسه قبل؛ شفقت به خود چیست؟ بررسی ویژگی‌ها و مهارت‌های آن و چگونگی تأثیرگذاری بر حالات روانی فرد؛ معرفی سه سیستم تنظیم هیجانی و نحوه تعامل با آنها.
چهارم	بررسی تکلیف و مرور جلسه قبل معرفی تصویرپردازی ذهنی و منطق آن. آموزش تمرين تصویرپردازی و اجرای آن در گروه (تصور رنگ، مکان و ویژگی‌های شفقت‌گر)
پنجم	بررسی تکلیف و مرور جلسه قبل؛ پرورش خودشفقت‌ورز و معرفی مفاهیم: خرد، توانایی، گرمی و مسئولیت‌پذیری در ایجاد شفقت.
ششم	بررسی تکلیف و مرور جلسه قبل؛ آموزش نامه نگاری شفقت‌ورز.
هفتم	بررسی تکلیف و مرور جلسه قبل؛ ترس از شفقت به خود؛ شناسایی افکار ممانعت از پرورش شفقت به خود
هشتم	پر کردن جدول هفتگی افکار انتقادگر، افکار شفقت‌ورز و رفتار شفقت‌ورز.
نهم	کار بر روی ترس از شفقت به خود و موانع پرورش این خصیصه. تنفس تسکین‌بخش ریتمیک، ذهن‌آگاهی.
دهم	جمع‌بندی و نتیجه‌گیری، اجرای پس‌آزمون.

یافته‌ها

بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه‌های پژوهش نشان داد که از لحاظ سن میانگین و انحراف معیار برای گروه درمان هیجان‌دار، گروه درمان مبتنی بر شفقت و گروه گواه به ترتیب ۴۵/۱±۳/۳، ۴۵/۴±۲/۷، ۴۵/۴±۱/۴ و ۴۶/۴±۲/۷ بود. سطح تحصیلات دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس برای گروه درمان هیجان‌دار به ترتیب ۹ (۶۰ درصد)، ۳ (۲۰ درصد)، ۲ (۱۳/۳ درصد)، ۱ (۶/۷ درصد)، برای گروه درمان مبتنی بر شفقت ۱۰ (۶۵/۲ درصد)، ۳ (۲۱/۵ درصد)، ۱ (۶/۶۵ درصد) و برای گروه گواه به ترتیب ۸ (۴۵/۷ درصد)، ۲ (۲۰/۹ درصد)، ۴ (۲۶/۷ درصد) و ۱ (۶/۷ درصد) بود. جنسیت مراقبان برای گروه درمان هیجان‌دار ۹ (۶۰ درصد) زن و ۶ (۴۰ درصد) مرد، برای گروه درمان مبتنی بر شفقت ۱۰ (۶۵/۵ درصد) زن و ۵ (۳۴/۵ درصد) مرد و برای گروه گواه ۸ (۵۵/۵ درصد) زن و ۴ (۴/۵ درصد) مرد بود. در جدول ۳ شاخص‌های توصیفی سوگ پیش از موعد و پریشانی روان‌شناختی به تفکیک گروه‌های پژوهش ارائه شده است.

مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان مبتنی بر شفقت بر سوگ پیش از موعد و پریشانی روانشناختی مراقبین بیماران مبتلا به سرطان
Comparing the Effectiveness of Emotion-Oriented Therapy and Compassion-Based Therapy on Premature ...

جدول ۳. شاخص‌های توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک سه گروه مطالعه شده در سه زمان

متغیر	مرحله	درمان هیجان‌مدار	درمان هیجان‌مدار	درمان هیجان‌مدار	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	انحراف معیار	میانگین	گواه
		پیش‌آزمون	پس‌آزمون	پیگیری	پیش‌آزمون	پس‌آزمون	پیگیری	موعد	بریشانی	روانشناختی	سوگ پیش از	سوگ پیش از	معیار
۱۲/۳۵	۱۸۲/۶۰	۱۲/۹۵	۱۸۶/۸۰	۱۶/۹۱	۱۸۷/۸۰	۱۸۷/۸۰	۱۸۷/۸۰	پیش‌آزمون	پیش‌آزمون	پس‌آزمون	پیش‌آزمون	پس‌آزمون	انحراف
۱۱/۵۴	۱۸۴/۴۰	۶/۸۸	۱۰۶/۶۰	۷/۷۴	۷۷/۵۳	۷۷/۵۳	۷۷/۵۳	موعد	موعد	موعد	موعد	موعد	انحراف
۱۱/۱۳	۱۸۴/۰۰	۶/۹۱	۱۰۷/۶۶	۷/۵۰	۷۸/۳۳	۷۸/۳۳	۷۸/۳۳	پیگیری	پیگیری	پیگیری	پیگیری	پیگیری	انحراف
۳/۹۴	۳۱/۴۰	۴/۵۰	۲۹/۴۰	۳/۹۳	۳۰/۲۰	۳۰/۲۰	۳۰/۲۰	پیش‌آزمون	پیش‌آزمون	پس‌آزمون	پس‌آزمون	پس‌آزمون	بریشانی
۳/۵۷	۲۹/۲۶	۲/۴۱	۱۷/۱۳	۲/۵۵	۱۰/۸۶	۱۰/۸۶	۱۰/۸۶	پس‌آزمون	پس‌آزمون	پیگیری	پیگیری	پیگیری	روانشناختی
۳/۵۴	۲۹/۱۳	۲/۲۴	۱۷/۲۰	۲/۱۶	۱۱/۱۳	۱۱/۱۳	۱۱/۱۳	پیگیری	پیگیری	پیگیری	پیگیری	پیگیری	معیار

در جدول ۳ شاخص‌های توصیفی میانگین و انحراف معیار برای متغیرهای سوگ پیش از موعد و پریشانی روانشناختی به تفکیک گروه‌ها و مراحل آزمون پژوهش ارائه گردیده است. همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، گروه درمان هیجان‌مدار میانگین سوگ پیش از موعد و پریشانی روانشناختی در پس‌آزمون و پیگیری نسبت به پیش‌آزمون کاهش داشته است. همچنین در درمان مبتنی بر شفقت نیز کاهش سوگ پیش از موعد و پریشانی روانشناختی نسبت به مرحله پیش‌آزمون مشاهده می‌شود. بررسی معنادار بودن این تغییرات با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه‌گیری مکرر صورت گرفت. قبل از مقایسه اثربخشی دو مداخله بر متغیرهای وابسته، پیش‌فرضهای تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد بررسی قرار گرفت که نتایج به دست آمده برای آزمون شاپیرو-ولک نشان داد که پیش‌فرض نرمال بودن داده‌ها در سوگ پیش از موعد و پریشانی روانشناختی در هر سه گروه و در هر سه مرحله آزمون رعایت شده است ($P > 0.05$). همچنین نتایج آزمون لوین نیز نشان داد پیش‌فرض همگنی واریانس پژوهش بین گروه‌ها در سه مرحله آزمون رعایت شده است ($P > 0.05$). برای هر دو متغیر سوگ پیش از موعد و پریشانی روانشناختی نیز نتایج آزمون ام باکس و کرویت موقّلی معنادار نبود ($P < 0.05$). در جدول ۴ نتایج ازمن تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر ارائه شده است.

جدول ۴. نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر

متغیر	منابع تغییرات	MS آزمایش	MS خطای آزادی	درجه	F آماره	P	مجذور اتا
سوگ پیش	گروه‌ها	۵۷۳۰۱/۵۶	۲۲۶/۲۲	۲	۲۵۳/۲۹	۰/۰۰۱	۰/۹۲۳
از موعد	مراحل	۱۱۶۲۰۸/۳۲	۱۳۰/۵۸	۴	۸۸۹/۹۱	۰/۰۰۱	۰/۹۵۵
تعامل مراحل با	گروه	۳۲۸۰۸/۷۲۳	۱۳۰/۵۸	۲	۲۵۱/۲۴	۰/۰۰۱	۰/۹۲۳
پریشانی	گروه‌ها	۱۸۵۵/۲۰	۲۰/۴۴	۲	۹۰/۷۵	۰/۰۰۱	۰/۸۱۲
روانشناختی	مراحل	۳۴۰۳/۸۸	۱۱/۲۴	۴	۳۰۲/۶۴	۰/۰۰۱	۰/۸۷۸
تعامل مراحل با	گروه	۶۵۹/۵۴	۱۱/۲۴	۲	۵۸/۶۴	۰/۰۰۱	۰/۷۳۶

نتایج جدول ۴ نشان می‌دهد که تفاوت مراحل آزمون، عضویت گروهی و تعامل مراحل و گروه برای هر دو متغیر سوگ پیش از موعد و پریشانی روانشناختی معنادار است ($P < 0.05$). این نتایج نشان می‌دهد که در مراحل آزمون (پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری)، عضویت در گروه‌های پژوهش و تعامل آنها تفاوت وجود دارد. برای بررسی نقاط تفاوت موجود از مقایسه زوجی بنفرنونی استفاده شد که نتایج آن در جدول ۵ ارائه شده است.

جدول ۵. نتایج آزمون مقایسات زوجی براساس تعدیل بونفرونی در متغیرهای پژوهش در سه مرحله

متغیر	مراحل	درمان هیجان مدار	درمان مبتنى بر شفقت	درمان مبتنى بر شفقت	اختلاف میانگین	اختلاف میانگین	مقدار p	اختلاف	مقدار p	مقدار p	مقدار p
سوگ پیش از موعد	پیش آزمون	پس آزمون	پیگیری	پیگیری	-۰/۸۰	-۰/۸۰	۰/۰۹۵	-۱/۰۶	۰/۱۷۰	۰/۰۰۱	۷۹/۱۳*
پریشانی روانشناختی	پیش آزمون	پس آزمون	پیگیری	پیگیری	-۰/۰۶	-۰/۰۶	۰/۰۰۱	۱۲/۲۶*	۰/۰۰۱	۱۲/۲۶*	۰/۰۰۱
پس آزمون	پیگیری	پس آزمون	پیگیری	پیگیری	-۰/۰۶	-۰/۰۶	۰/۰۰۱	۱۲/۲۰*	۰/۰۰۱	۱۲/۲۰*	۰/۰۰۱
پس آزمون	پیگیری	پس آزمون	پیگیری	پیگیری	-۰/۰۶	-۰/۰۶	۱/۰۰۰	-۰/۰۶	۱/۰۰۰	-۰/۰۶	۸۰/۲۰*

*P<0/001

نتایج به دست آمده از جدول ۵ نشان می‌دهد که در دو گروه آموزشی درمان هیجان مدار و درمان مبتنى بر شفقت تفاوت معناداری بین دو مرحله پس آزمون و پیگیری در متغیرهای پریشانی روانشناختی، سوگ پیش از موعد و مؤلفه‌های آن در مراقبین بیماران مبتلا به سرطان مشاهده نشد؛ بهطوری که میانگین نمرات متغیرهای پریشانی روانشناختی، سوگ پیش از موعد در مرحله پس آزمون در همنسب با پیش آزمون کاهش معنادار و این کاهش تا در مرحله پیگیری تداوم داشته است.

بحث و نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان هیجان مدار و درمان مبتنى بر شفقت بر سوگ پیش از موعد، پریشانی روانشناختی مراقبین بیماران مبتلا به سرطان انجام شد. نتایج نشان داد که درمان هیجان مدار نسبت به درمان مبتنى بر شفقت اثربخشی بیشتری بر کاهش سوگ پیش از موعد مراقبین بیماران مبتلا به سرطان دارد. این یافته با نتایج مطالعات تقندر و همکاران (۱۴۰۱)، عبدی (۱۳۹۸)، علی‌پور (۱۳۹۵)، الیوت و مکدونالد (۲۰۲۱) همسو بود. در تبیین این یافته باید خاطر نشان کرد که افراد دچار سوگ پیش از موعد در خیلی از موقع درگیری ذهنی شدیدی که عموماً شامل نشخوارهای ذهنی و عاطفی است را در رابطه با فرد بیمار تجربه می‌کنند. درمان هیجان مدار با افزایش آگاهی هیجانی باعث شد که مراقبین هیجانات منفی همچون خشم، احساس گناه، خود سرزنشی، اضطراب، استرس، افسردگی را کنترل نموده و میزان سازگاری و تاب‌آوری خود را بالا ببرند. درواقع درمان هیجان مدار با کمک به بهبود توانایی نمادی‌سازی هیجانات، منجر به این می‌شود تا عکس‌العمل‌های روانشناختی غیرعادی کم شوند و توانایی افراد برای خود مراقبتی و خود نظم‌دهی بهبود یابد که این مساله سبب کاهش شدت هیجانات منفی می‌شود (عبدی، ۱۳۹۸). از دیگر سو در درمان هیجان مدار تمرکز درمانگر نه تنها بر به آگاهی درآوردن محتواهای ذهنی است که از جانب درمانجو مورد انکار یا تحریف قرار گرفته است، که ایجاد معنی تازه متأثر از تجربه بدنی درمانجو را نیز در نظر دارد، بنابراین در مقایسه با درمان مبتنى بر شفقت، درمان هیجان مدار، هیجان پشت سوگ پیش از موعد که عموماً غم و شرم است را نمایان کرده و فرد را از آن آگاه می‌سازد. و درمان مبتنى بر هیجان فرد را از هیجان آگاه کرده و با تجربه کردن هیجان و پردازش هیجان به پذیرش و معنایابی کمک کند و به تبع آن درگیری شدن با سوگ پیش از موعد کاهش پیدا می‌کند (الیوت و مکدونالد، ۲۰۲۱).

یافته دیگر پژوهش نشان داد درمان هیجان مدار نسبت به درمان مبتنى بر شفقت اثربخشی بیشتری بر کاهش پریشانی روانشناختی مراقبین بیماران مبتلا به سرطان دارد. این یافته با نتایج مطالعات آذری و همکاران (۱۴۰۰)، خلعتبری و همکاران (۱۳۹۹)، حسین زاده و همکاران (۱۳۹۹)، فقیه و کاظمی (۱۳۹۷)، باراندی و کازیا (۲۰۲۲)، ورابل و همکاران (۲۰۲۱)، ونوگ و همکاران (۲۰۲۱)، مارش و همکاران (۲۰۲۱)، داج و راتانا سیرینگ (۲۰۱۹) همسو بود. در تبیین این یافته می‌توان گفت که رسالت درمان هیجان مدار علاوه بر ایجاد رابطه کارآمد، آموزش مهارت‌هایی برای تنظیم هیجانات است. آگاهی از هیجانات اولیه و زیرینایی نقش مهمی در کاهش پریشانی روانشناختی دارد. چراکه در بسیاری از موارد علت پریشانی روانشناختی، هیجانات زیرینایی ناشناخته نظیر درمانگری است. تغییر هیجان روانشناختی با استفاده از تکنیک‌های درمانی خاص مانند همدلی آینه‌وار، کشف سبک پردازش هیجانی مراجع و بازنمایی تجربه‌ای احساسات دردناک مراجع مرتبط با دلبستگی یا هویت که به تحریک احساسات و پردازش آن منجر می‌شود، کمک می‌کند (خلعتبری و

مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌مدار و درمان مبتنی بر شفقت بر سوگ پیش از موعد و پریشانی روانشناختی مراقبین بیماران مبتلا به سرطان
Comparing the Effectiveness of Emotion-Oriented Therapy and Compassion-Based Therapy on Premature ...

همکاران، ۱۳۹۹). بر این اساس در درمان هیجان‌مدار پس از آن که فرد هیجانات خود را بدون اجتناب در محیط امن درمان، درک، پردازش و تنظیم می‌کند، در نهایت کمتر از افکار تکراری همچون نشخوار فکری جهت اجتناب از آنها استفاده می‌کند و در توالی این مسیر پریشانی روانشناختی کاهش پیدا می‌کند (ونگ و همکاران، ۲۰۲۱).

در واقع در روش‌های درمان گروهی هیجان‌مدار تلاش می‌شود تا در جریان درمان، مراقبین بیماران تشویق شوند تا افکار ناراحت کننده خود را مورد سؤال قرار داده و خودگویی‌های جایگزین برای مقابله با این هیجانات و نشخوارهای فکری که سبب آشفتگی هم از لحاظ جسمانی و روانی می‌شود را برطرف نمایند. پرداختن به این موضوعات در جلسات آموزشی گروهی هیجان‌مدار منجر به بهبود پریشانی روانشناختی می‌گردد. همچنین درمان هیجان‌مدار، آشفتگی‌های مراقبین بیماران را که توسط حالت‌های فراگیر از عاطفه منفی و آسیب‌های دلبرستگی، عدم توجه به نیازها و خواسته‌های درونی، الگوهای تعاملی منفی و تجربه هیجانی نامناسب ایجاد شده و ادامه پیدا کرده، مورد شناسایی قرار داده و به پیام‌های قابل درک و سازنده تبدیل نموده است که به نوبه خود سهم مهمی در کاهش سوگ پیش از موعد داشته و در نهایت از آنجایی که تأکید درمان هیجان‌مدار بر تجربه، رویارویی، رشد و کمال، خودانگیختگی، عمل و لحظه‌های اینجا و اکنون بوده اثربخشی بیشتری نسبت به درمان مبتنی بر شفقت داشته است.

عدم نمونه‌گیری تصادفی، نمونه محدود به شهر شاهroud و محدودیت در تعیین پذیری نتایج به دست آمده، محدودیت عمدۀ پژوهش حاضر بود. بنابراین پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی جمعیت‌های دیگر نیز مورد مطالعه قرار گیرند و در جهت بالا بردن تعیین‌پذیری نتایج به دست آمده جمعیت‌هایی مورد مطالعه قرار گیرند که امکان نمونه‌گیری تصادفی و در نتیجه بالا بردن قدرت تعیین‌پذیری نتایج، فراهم باشد. از لحاظ کاربردی علاوه بر اینکه روانشناسان و مشاوران می‌توانند برپایه نتایج به دست آمده از دو مداخله درمان مبتنی بر هیجان و درمان مرتمکز بر شفقت با اولویت درمان مبتنی بر هیجان در جهت کاهش سوگ پیش از موعد، پریشانی روانشناختی مراقبین بیماران مبتلا به سرطان استفاده کنند، همچنین متولیان سلامت جامعه نیز می‌توانند بر پایه نتایج بدست آمده آموزش‌های بر پایه هر دو مداخله در جهت بهبود سوگ پیش از موعد، پریشانی روانشناختی مراقبین بیماران مبتلا به سرطان تولید و در رسانه‌های دیداری و شنیداری عمومی و یا از طریق بیمارستان‌ها و سازمان‌های خدمت رسان در دسترس قرار دهند.

تضاد منافع: نویسنده‌گان هیچ تضاد منافعی در رابطه با این پژوهش اعلام نمایند.

تقدیر و تشکر: پژوهشگران از تمامی کسانی که با مشارکت خود به اجرای پژوهش کمک کردند و همچنین از مرکز توسعه پژوهش‌های بالینی بیمارستان امام حسین (ع) و بیمارستان بهار که با همکاری خود به اجرای پژوهش کمک کردند، نهایت تقدیر و تشکر را دارند.

منابع

اسکویی، پ، فرحبخش، ک. و مرادی، ا. (۱۴۰۰). ماندن در سوگ: مطالعه پدیدارشناسانه تجربه سوگ نابهنجار بعد از مرگ عضوی از خانواده. *دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی*, ۴(۲۲). <https://doi.org/10.30486/JSRP.2020.1906125.2544>

احمدی، ع. وزیری، ش.، آهی، ق.، لطفی کاشانی، ف. و اکبری، م. (۱۴۰۰). مقایسه تأثیر مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد و معنویت‌درمانی بر کاهش پریشانی روان‌شناختی (اضطراب، افسردگی و استرس) بیماران مبتلا به سرطان پستان. *مجله مطالعات ناتوانی*, ۱۱(۱)، ۳۶-۴۶.

<http://jdisabilstud.org/article-1-2500-fa.html>

آذری، و.، کاظمیان مقدم، ک. و محراجی زاده هنرمند، م. (۱۴۰۰). اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر تحمل پریشانی و اسنادهای ارتباطی زنان متقاضی طلاق. *پژوهش‌های روان‌شناختی*, ۱(۲۳). <https://doi.org/10.1001.110199616.1400.2201.48> ۸۰-۹۹

بنی‌اسدی، ف.، پورشیریفی، ح.، برجعلی، ا. و مفید، ب. (۱۴۰۰). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان‌شناختی افراد مبتلا به سرطان پروستات. *طب پیشگیری*, ۸(۱)، ۱۲-۲۲. <http://jpm.hums.ac.ir/article-1-484-fa.html>

ثنائگوی محرر، غ.، شیرازی، م.، محمدی، ر. و مقصودلو، ف. (۱۳۹۷). اثربخشی درمان هیجان‌مدار بر کاهش عالیم اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به اسکلرroz (ام. چندگانه). *مجله دانشکده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد*, ۶۱(۱)، ۲۰۰-۲۰۰.

حسین‌زاده، ز.، قربان شیرودی، ش.، خلعتبری، ج. و رحمانی، م. (۱۳۹۹). اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار در مقایسه با رویکرد واقعیت‌درمانی بر انعطاف‌پذیری کنشی و تحمل پریشانی زوج‌ها. *فصلنامه روان‌شناسی کاربردی*, ۱۴(۲)، ۱۲۲-۱۰۱. <https://doi.org/10.52547/apsy.14.2.101>

خلعتبری، آ.، قربان شیرودی، ش.، زربخش، م. و تیزدست، ط. (۱۳۹۹). مقایسه اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ولع خوردن، کیفیت زندگی و پریشانی روان‌شناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲. *فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی سلامت*, ۹، ۷-۲۴.

<https://doi.org/10.30473/hpj.2020.53961.4884>

دلار، ع. (۱۳۹۱). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. انتشارات ارسباران.

دهقانی نیشابوری، م. (۱۳۹۱). گروه درمانی هیجان مدار برای مادران کودکان مبتلا به سرطان: سهم سبک‌های مقابله‌ای و سئگ پیش از موعد در بهزیستی روان‌شناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.

رمضانی، ب. و بختیاری، ف. (۱۳۹۷). اثربخشی معنویت درمانی بر اجتناب شناختی و پریشانی روان‌شناختی سالمدان حاضر در خانه سالمدان. *سالمدان‌شناسی*, ۳، ۴۳-۴۶.

<URL: http://joge.ir/article-1-276-fa.html>

سبحانی، م. (۱۴۰۰). نقش واسطه‌ای معنای زندگی در رابطه بین سبک دلستگی فرد و سوگ پیش از موعد در والدین کودکان با بیماری‌های خاص. *مطالعات اسلامی در حوزه سلامت*, ۵، ۳۵-۴۵.

<https://sid.ir/paper/1028614/fa>

طاهرخانی، م.، محمدی، ف.، رشوند، ف. و مطلبی، آ. (۱۴۰۰). پیش‌بینی کننده‌های فشار مراقبتی در مراقبین سالمدان تحت درمان با دیالیز. *سالمدان: مجله سالمدانی ایران*, ۱۶، ۴۲-۴۷.

<URL: http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-2173-fa.html>

طبیب‌زاده، ف.، سلیمانی، ا. و قربان شیرودی، ش. (۱۳۹۹). اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر خستگی ناشی از سرطان و رفتارهای خودمراقبتی بیماران مبتلا به سرطان. *رویش روان‌شناسی*, ۹، ۲۶-۳۱.

<URL: http://frooyesh.ir/article-1-2388-fa.html>

عیدی، د. و دهقانی آرایی، ف. (۱۳۹۷). رابطه فشار مراقبتی با کیفیت زندگی بیمار در مراقبین زنان با سرطان پستان. *فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی*, ۱۲، ۳۰-۳۹.

<URL: http://rph.knu.ac.ir/article-1-3152-fa.html>

عبدی، ف. (۱۳۹۸). اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر شدت واکنش سوگ، احساس ناکامی و افسردگی زنان دارای تجربه سوگ. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره گرایش خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی محقق اردبیلی.

علی‌پور، م. (۱۳۹۵). اثربخشی گروه‌درمانی هیجان‌مدار بر تاب‌آوری و آثار سوگ در زنان مبتلا به سوگ نابهنجار. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.

فقیه، ص. و کاظمی، ح. (۱۳۹۷). اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر تحمل پریشانی زوجین نابارور شهر اصفهان. *سلامت جامعه*, ۱۲، ۲۹-۲۲.

<CHJ.2018.110652.1068/10.22123>

کیارسی، ز.، عمامیان، ع. و حسن زاده، ر. (۱۴۰۰). مقایسه درمان متمرکز بر شفقت و معنادرمانی بر اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان. *رویش روان‌شناسی*, ۱۰، ۸، ۱۸۵-۱۹۶.

<URL: http://frooyesh.ir/article-1-2834-fa.html>

لسلی، س. گ. (۲۰۰۵). درمان هیجان‌مدار: اصول و مبانی. ترجمه اکبری، ح. و رفیع، ط. (۱۳۹۶). انتشارات بات.

نقندر، م.، مرغزاری، م. و طالقانی، ع. (۱۴۰۱). تاثیر درمان هیجان‌مدار بر انعطاف‌پذیری کنشی و اضطراب مرگ بیماران عروق کرونر قلب. *فصلنامه های نوین روان‌شناسی*, ۱۲، ۱-۱۵.

<URL: http://jnlp.ir/article-1-703-fa.html>

یعقوبی، ح. (۱۳۹۴). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه ۱۰ سوالی پرسشنامه پریشانی روان‌شناختی کسلر (K10). *فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی*, ۶، ۵۷-۴۵.

<JAPR.2016.57963/10.22059>

Anderson, L. S., Grimsrud, A., Myer, L., Williams, D. R., Stien, D. J., & Seedat S. (2011). The psychometric properties of the K10 and K6 scales in screening for mood and anxiety disorders in the South African Stress and Health study. *International Journal Methods Psychiatr Research*, 20(4), 215-223. <DOI: 10.1002/mpr.351>

Baharandi B, Kazei K. (2022). The Effectiveness of Compassion-Focused Therapy on Ambiguity Tolerance and Death Anxiety in the Elderly. *Aging Psychol*, 6(1), 13-26. <doi:10.22126/jap.2020.5148.1409>

Dutch, M. S., & Ratanasiripong, P. (2019). Marriage family therapist's attitudes toward evidencebased treatments and readiness for change. *Journal of Psychotherapy Integration*, 27(4), 540-547. <DOI: 10.1037/a0040054>

Evrard, R., Dollander, M., Elsaesser, E., Lorimer, D. (2021). Exceptional necrophanic experiences and paradoxical mourning: Studies of the phenomenology and the repercussions of frightening experiences of contact with the deceased. *L'Évolution Psychiatrique*, 86(4), 1-24. <https://doi.org/10.1016/j.evopsy.2021.09.001>

Elliott, R., Macdonald, J. (2021). Relational dialogue in emotion-focused therapy. *Journal of Clinical Psychology*, 77(2), 414-28. <DOI: 10.1002/jclp.23069>

Glick, D., Motta, M., Wiegand, D., Range, P. (2018). Anticipatory grief and impaired problem solving among surrogate decision makers of critically ill patients: A cross-sectional study. *Intensive and Critical Care Nursing*, 49(11), 1-15. <DOI: 10.1016/j.iccn.2018.07.006>

Gilbert, P., McEwan, K., Matos, M., & Rivis, A. (2010). Fears of compassion: Development of three self-report measures. *Psychology and Psychotherapy: Theory, research and practice*, 84(3), 239 -255. <DOI: 10.1348/147608310X526511>

Irons, C., Lad, S. (2019). Using compassion focused therapy to work with shame and self-criticism in complex trauma. *Australian Clinical Psychologist*, 3(1), 47-54.

مقایسه اثربخشی درمان هیجان‌دار و درمان مبتنی بر شفقت بر سوگ پیش از موعد و پریشانی روانشناسی مراقبین بیماران مبتلا به سرطان
Comparing the Effectiveness of Emotion-Oriented Therapy and Compassion-Based Therapy on Premature ...

- Irenaeus, S., Garmo, H., Gedeborg, R., Robinson, D., Stattin, P., Beckmann, K. (2024). Patterns of treatment in men with intermediate-, high-, and very high-risk prostate cancer according to their modelled life expectancy. *European Urology*, 1(85), 1265-1276. [https://doi.org/10.1016/S0302-2838\(24\)01003-0](https://doi.org/10.1016/S0302-2838(24)01003-0)
- Johannsen, M., Schlander, C., Vestergaard, I. (2022). Group-based compassion-focused therapy for prolonged grief symptoms in adults – Results from a randomized controlled trial. *Psychiatry Research*, 314(9), 46-53. [DOI: 10.1016/j.psychres.2022.114683](https://doi.org/10.1016/j.psychres.2022.114683)
- Kessler, R.C., Andrews, G., Colpe, L.J., Hiripi, E., Mroczek, D.K., Normand, S.L. T., Walters, E.E. & Zaslavsky, A.M. (2003). Short screening scales to monitor population prevalence's and trends in nonspecific psychological distress. *Psychological Medicine*, 32(6), 959-976. [DOI: 10.1017/s0033291702006074](https://doi.org/10.1017/s0033291702006074)
- Marsh, I. C., Chan, S. W., & MacBeth, A. (2021). Self-compassion and psychological distress in adolescents—a meta-analysis. *Mindfulness*, 9(4), 1011-1027. [DOI: 10.1007/s12671-017-0850-7](https://doi.org/10.1007/s12671-017-0850-7)
- Song, Q., Liu, C., Wang, J., Yin, G. (2022). Course and predictors of psychological distress among colorectal cancer survivors with ostomies: A longitudinal study. *European Journal of Oncology Nursing*, 59(9), 21-29. [DOI: 10.1016/j.ejon.2022.102170](https://doi.org/10.1016/j.ejon.2022.102170)
- Tian, S., Huangfu, L., Deng, J., Shi, L., & Lu, L. (2024). Associations of sleep pattern with survival and life expectancy of cancer patients. *Sleep Medicine*, 1(115), 92-104. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2023.11.281>
- Tu, T., Tran, T., Kwon, H., & Cho, H. (2023). Frailty-adjusted life expectancy and survival in older lung cancer patients: A large-scale electronic health-record based study. *Annals of Oncology*, 34(40), 165-177. <https://doi.org/10.1016/j.annonc.2023.10.573>
- Vrabel, K., Wampold, B., Quintana, D., Goss, K., Waller, G., Hoffart, A. (2019). The modum-ED trial protocol: comparing compassion-focused therapy and cognitive-behavioral therapy in treatment of eating disorders with and without childhood trauma: Protocol of a randomized trial. *Frontiers in psychology*, 18(10), 16-38. [doi: 10.3389/fpsyg.2019.01638](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01638)
- Wnuk, S., Greenberg, L., Dolhanty, J. (2021). Emotion-focused group therapy for women with symptoms of bulimia nervosa. *Eating Disorders*, 23(3), 253-261. [DOI: 10.1080/10640266.2014.964612](https://doi.org/10.1080/10640266.2014.964612)
- Yu, W., Lu, Q., Lu, Y., Yang, H., Zhang, L. (2021). Anticipatory Grief among Chinese Family Caregivers of Patients with Advanced Cancer: A Cross-Sectional Study. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, 8(4), 369-376. [DOI: 10.4103/apjon.apjon-214](https://doi.org/10.4103/apjon.apjon-214)